

***Indagine multiscopo sulle famiglie
Viaggi e vacanze
Anno 2009***

Manuale per l'utente

Per informazioni sull'acquisto rivolgersi a:
Istat – Servizio Sistema informativo
diffusione e servizi all'utenza
via Cesare Balbo, 16 – 00184 Roma
tel: 06.4673.4126
fax: 06.46678200
<https://contact.istat.it/>

Per informazioni sull'indagine rivolgersi a:
Istat - Servizio struttura e dinamica sociale
U.O. Integrazione sociale dei migranti,
mobilità, domanda turistica
via Adolfo Ravà, 150 – 00142 Roma
tel: 06.4673.4655, 4616
fax: 06.4673.4596
e-mail: maditorr@istat.it

INDICE

1. PREMESSA.....	3
2. L'INDAGINE TRIMESTRALE “VIAGGI E VACANZE”	3
3. I DATI CAMPIONARI E IL LORO UTILIZZO	4
APPENDICE A - IL QUESTIONARIO	7
APPENDICE B - ALCUNE DEFINIZIONI.....	8
APPENDICE C - STRATEGIA DI CAMPIONAMENTO E VALUTAZIONE DEGLI ERRORI CAMPIONARI	9

1. PREMESSA

Il decreto legislativo n. 322 del 6/9/1989 regola la diffusione delle informazioni statistiche prodotte nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale al fine di garantire la riservatezza dei rispondenti. In particolare, per la diffusione di dati elementari, l'articolo 10, comma 2, dispone quanto segue: "Sono distribuite altresì, ove disponibili, su richiesta motivata e previa autorizzazione del Presidente dell'Istat, collezioni campionarie di dati elementari, resi anonimi e privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con singole persone fisiche e giuridiche".

Nell'osservanza di tale disposizione e del d. lgs del 30/06/2003 n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*) l'Istat ha adottato misure e tecniche che rendono impossibile, o altamente improbabile, il collegamento dei dati rilasciati con l'unità statistica a cui si riferiscono. Per tale motivo vengono apportate alcune modifiche sui file originali delle indagini, nell'intento di garantire la massima protezione ai dati, contenendo al minimo la perdita di informazioni. Le metodologie applicate si concretizzano nell'accorpamento e/o riclassificazione di modalità di variabili e nell'oscuramento di variabili. In quest'ultimo caso nei campi del tracciato record è riportata la dicitura "RISERVATO ISTAT".

Va considerato inoltre che la stessa dicitura è stata utilizzata anche per quelle informazioni che, pur essendo state oggetto di indagine, non sono risultate essere attendibili dal punto di vista campionario e quindi statisticamente non analizzabili.

2. L'INDAGINE TRIMESTRALE "VIAGGI E VACANZE"

A partire dal 1997, l'Istat conduce l'indagine trimestrale telefonica CATI¹ "Viaggi e vacanze" su un campione nazionale annuo di circa 14.000 famiglie (circa 3.500 per trimestre per un totale annuo di circa 40.000 individui). L'indagine, in conformità alla Direttiva 95/57/CE attuata dal Consiglio dell'Unione Europea il 23/11/1995, ha l'obiettivo di quantificare e analizzare i flussi turistici dei residenti in Italia, sia all'interno del Paese che all'estero, oltre che di fornire informazioni circa le modalità di effettuazione dei viaggi e le caratteristiche socio-demografiche dei turisti².

Le informazioni vengono rilevate per tutti i componenti della famiglia. L'intervista viene eseguita intervistando, nella famiglia, una persona di almeno 18 anni che fornisce notizie sia per sé che per ciascun altro componente.

I periodi di osservazione sono i trimestri gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre: per ciascun periodo vengono rilevate, per tutti i componenti delle famiglie del campione, informazioni sui viaggi conclusi nel trimestre, indipendentemente dalla loro data di inizio.

Rispetto alle precedenti indagini dell'Istat sulle vacanze degli italiani, esperienza iniziata nel 1959, proseguita con cadenza pluriennale sino al 1993³ e successivamente con cadenza annuale nell'indagine "Aspetti della vita quotidiana", l'indagine trimestrale "Viaggi e vacanze" rileva, per la prima volta e con carattere di continuità, anche informazioni sulle vacanze di breve durata (1-3 notti) e sul turismo per motivi di lavoro.

L'indagine costituisce, infatti, la prima esperienza nella raccolta di informazioni trimestrali sui viaggi con almeno un pernottamento realizzati dai residenti per ragioni di lavoro o di vacanza e tale peculiarità permette di disporre sistematicamente, in aggiunta ai dati sul movimento dei clienti nelle strutture ricettive⁴, anche di informazioni sul numero e sulle caratteristiche dei viaggi e dei turisti.

Tali informazioni sono ormai ritenute necessarie a comprendere più a fondo la complessità del fenomeno turismo; l'indagine arricchisce così il quadro informativo finora esistente a livello nazionale.

¹ Computer Assisted Telephone Interview.

² La metodologia e l'organizzazione dell'indagine sono disponibili all'indirizzo www.istat.it/dati/catalogo/20060615_00/.

³ Le indagini sulle vacanze degli italiani condotte dall'Istat fino al 1982, e in particolare con riferimento agli anni 1959, 1965, 1968, 1972, 1975, 1978 e 1982 hanno avuto per oggetto le vacanze di almeno 3 notti consecutive di durata. Per le successive indagini, la definizione di vacanza è stata estesa a periodi di almeno 4 notti consecutive. Dal 1982 al 1993 tali indagini hanno avuto per oggetto, con riferimento però al solo mese di ottobre, anche le brevi vacanze (di durata non superiore a 3 notti consecutive, ma comunque con un pernottamento fuori dal luogo di residenza abituale) ed i viaggi per altri motivi (di almeno una notte di durata), cioè effettuati per motivi diversi da quelli della vacanza (affari, lavoro temporaneo fuori sede, convegni, salute, studio, pellegrinaggi, ecc.).

⁴ I dati si riferiscono alle statistiche correnti Istat dell'attività degli esercizi ricettivi alberghieri e delle altre strutture ricettive (consistenza degli esercizi e movimento dei clienti).

I risultati dell'indagine sono pubblicati annualmente nel volume "I viaggi in Italia e all'estero" della Collana Informazioni Istat. A partire dal 2007, la pubblicazione dei volumi è sostituita dal rilascio di tavole di dati⁵.

La rilevazione utilizza le definizioni standard indicate nella metodologia adottata per l'attuazione della Direttiva 95/57/CE sulle Statistiche del Turismo. In particolare, i flussi turistici vengono individuati in quegli spostamenti con pernottamento effettuati fuori dal luogo in cui si vive. In tal senso, per una corretta interpretazione dei dati, assume notevole importanza il significato delle definizioni adottate:

- **viaggio**: spostamento realizzato, per turismo di vacanza o per ragioni di lavoro, fuori dal luogo dove si vive e che comporta almeno un pernottamento nel luogo visitato. Sono esclusi i viaggi e gli spostamenti effettuati nelle località frequentate abitualmente tutte le settimane con soste di uno o più pernottamenti, nonché i viaggi di durata superiore ad un anno. In questi casi, infatti, il viaggio non costituisce flusso turistico poiché la località visitata viene associata al luogo dove si vive;
- **turista**: un individuo viene considerato "turista" se ha effettuato uno o più viaggi nel trimestre di riferimento dell'indagine.

I viaggi sono distinti per motivo, secondo la seguente tipologia:

- **viaggio per motivi di lavoro o professionali**: viaggio svolto per motivi prevalenti di lavoro temporaneo fuori sede o più in generale per motivi professionali (missione, partecipazione a congressi, convegni ecc.). In questi viaggi sono inclusi anche quelli effettuati per formazione/aggiornamento professionale o per sostenere concorsi;
- **viaggio di vacanza**: viaggio svolto per motivi prevalenti di relax, piacere, svago o riposo, per visite a parenti o amici, per motivi religiosi/pellegrinaggio, per cure termali o trattamenti di salute.

In relazione alla durata, le vacanze sono distinte in:

- **vacanza "breve"**: quando la durata del soggiorno è inferiore a 4 notti;
- **vacanza "lunga"**: quando la durata del soggiorno è di 4 o più notti.

Le informazioni **destinazione, mezzo di trasporto, tipo di alloggio, motivo della vacanza, tipo della vacanza di piacere/svago, motivo del viaggio di lavoro** sono rilevate sulla base del concetto della "prevalenza". In particolare, la destinazione del viaggio ed il tipo di alloggio vengono associate rispettivamente alla località ed al tipo di alloggio in cui è stato trascorso il maggior numero di notti, mentre il mezzo di trasporto viene indicato come il mezzo con cui è stata coperta la maggiore distanza.

3. I DATI CAMPIONARI E IL LORO UTILIZZO

Vengono messi a disposizione degli utenti i seguenti file di dati elementari:

- **un file degli individui** (tipo A o tipo B)
lunghezza record: 107 bytes
numero record: 35318
- **un file dei viaggi** (tipo A o tipo B)
lunghezza record: 132 bytes
numero record: 14609

Per garantire la riservatezza delle informazioni a tutela della privacy e per limiti connessi alla numerosità campionaria, non è possibile fornire contemporaneamente i dati sulle suddivisioni territoriali di residenza: regione e tipologia socio-demografica del comune. Per questo motivo, del file individui e del file viaggi sono predisposte due versioni (tipo A e tipo B):

- la prima (**tipo A**) con i codici della regione (REG) e della ripartizione geografica (RIP);
- la seconda (**tipo B**) con i codici della tipologia socio-demografica del comune (DOM) e della ripartizione geografica (RIP).

Le due versioni non possono essere ricongiunte in quanto ogni singola famiglia ha nei due file un identificativo familiare (IDFAM) diverso.

⁵ Il volume e le tavole sono consultabili sul sito Istat <http://www.istat.it>.

I file sono riferiti all'intero anno e sono ottenuti mettendo in sequenza i quattro file trimestrali; in ogni record è specificato il trimestre di riferimento (TRIM).

Il **file individui** è composto da un record per ciascun individuo componente la famiglia. Ogni record "individuo" contiene una prima parte (coll. 1-44) di informazioni generali sulla famiglia e sull'individuo (codici identificativi e caratteristiche territoriali), una seconda parte (coll. 45-64) contenente il numero di viaggi effettuati dalla famiglia e una terza parte (coll. 65-107) di informazioni sull'individuo (caratteristiche socio-demografiche e numero di viaggi effettuati dall'individuo). Ciò significa che nel file individui sono rappresentati tanto gli individui che hanno viaggiato (turisti), quanto quelli che non hanno viaggiato: quindi è possibile, con riferimento ad ogni trimestre, individuare la quota di popolazione che ha viaggiato e la quota di popolazione che non ha viaggiato.

Il **file viaggi** è composto da un record per ciascun viaggio realizzato da un individuo. Ogni record "viaggio" contiene una prima parte di informazioni generali sulla famiglia e sull'individuo (che corrisponde alle coll. 1-31 del file individui) e una seconda parte (coll. 32-132) di informazioni dettagliate sul viaggio (durata, destinazione, mezzo di trasporto, alloggio, ecc.).

Nel caso in cui due o più componenti della famiglia abbiano effettuato un viaggio insieme, sono presenti tanti record "viaggio" quanti sono i partecipanti al viaggio. In ogni record "viaggio" è presente il numero dei partecipanti della famiglia allo stesso viaggio (NPART) ed una variabile (INSIEME) che permette di individuare i record "viaggio" effettuati insieme (si tratta di un numero progressivo entro la famiglia che si ripete per tutti i viaggi fatti insieme da componenti della famiglia stessa). Per distinguere i viaggi di lavoro dai viaggi di vacanza è presente una variabile (TIPOVIA) che individua la tipologia del viaggio. Nel caso di più componenti familiari partecipanti allo stesso viaggio, coincidono tutte le caratteristiche del viaggio (la data di inizio, la durata, il mezzo, la destinazione, ecc.), ad eccezione della tipologia del viaggio (TIPOVIA): è infatti ammesso che alcuni dei partecipanti abbiano viaggiato per motivi di lavoro e altri per motivi personali (vacanza, ecc.).

Per una corretta utilizzazione dei dati, si rammenta che l'indagine rileva i viaggi che si concludono in ciascun trimestre di riferimento, indipendentemente dalla data di inizio.

Per un corretto utilizzo dei file si precisa che è possibile effettuare elaborazioni sulle seguenti unità di analisi:

- a) **famiglie**: volendo analizzare le famiglie occorre selezionare solo il primo componente di ciascuna, utilizzando il numero d'ordine all'interno della famiglia (IDIND=01). Ogni famiglia è individuata da: trimestre di riferimento (TRIM), numero progressivo della famiglia all'interno del trimestre (IDFAM).
- b) **individui**: ogni individuo è identificato da: trimestre di riferimento (TRIM), numero progressivo della famiglia (IDFAM) all'interno del trimestre, numero d'ordine dell'individuo all'interno della famiglia (IDIND).
- c) **viaggi**: ogni viaggio è individuato da: trimestre di riferimento (TRIM), numero progressivo della famiglia all'interno del trimestre (IDFAM), numero progressivo del viaggio all'interno della famiglia (IDVIA).
- d) **notti**: le notti trascorse in viaggio sono espresse dalla durata del viaggio (DURATA) presente nel file viaggi.

Le informazioni riportate nei file sono di carattere campionario. In particolare, ciascun sotto-file trimestrale si riferisce ad un campione di circa 3.500 famiglie che viene selezionato in modo indipendente dai campioni delle altre tre rilevazioni.

Dato il carattere campionario dell'indagine, per ottenere stime relative all'intera popolazione di riferimento (le famiglie residenti in Italia e gli individui che le compongono, al netto dei membri permanenti delle convivenze), è necessario procedere alla ponderazione dei dati elementari, attraverso i coefficienti di riporto all'universo (contenuti, in ciascun record, nella variabile COE). I valori contenuti in questa variabile, calcolati separatamente per ciascun trimestre, rappresentano il peso che ogni unità campionaria ha nella popolazione e nel trimestre di riferimento. Il COE è espresso con due valori decimali separati dal punto (es. "04782.72"). Per l'elaborazione dei dati si consiglia di utilizzare il COE arrotondato all'unità. I coefficienti di riporto all'universo sono stati determinati in modo da poter essere utilizzati indifferentemente per costruire stime trimestrali relative alle famiglie, agli individui, ai viaggi e alle notti.

Ad esempio, se in un record individuale del primo trimestre la variabile COE vale "04782.72", significa che l'individuo rappresenta 4.782,72 individui nella popolazione residente in Italia nel primo trimestre dell'anno. Ponderando quindi per questo valore i dati presenti nel suo record, le caratteristiche relative a tale individuo saranno stimate per 4.782,72 individui. Di conseguenza, ponderando i dati di tutti gli individui campionati in un trimestre, si otterranno stime riferite all'intera

popolazione residente in Italia in quel trimestre. Analogamente, ponderando i dati contenuti nel file viaggi sarà possibile ottenere stime sui viaggi effettuati dai residenti in Italia con riferimento a ciascun trimestre di indagine.

Per quanto appena detto, è importante sottolineare che, mentre i viaggi e le notti rilevati in ciascun trimestre possono essere sommati per ottenere la stima annuale, non è corretto sommare i file trimestrali degli individui, per non quadruplicare la popolazione. Per evitare ciò, qualora si volessero comunque utilizzare dati sugli individui rilevati in tutti e quattro i trimestri, sarà necessario far riferimento ad un valore medio di popolazione, utilizzando il coefficiente COE diviso per 4. Analogamente, i dati trimestrali sul numero dei turisti (cioè il numero di individui che hanno fatto almeno un viaggio in un dato trimestre) non sono sommabili, in quanto una stessa persona può essere stata turista in trimestri diversi. Un'eventuale somma dei turisti trimestrali comporterebbe, pertanto, una sovrastima del numero annuale dei turisti.

L'indagine ha la finalità di fornire stime di parametri di diversa natura con riferimenti temporali e territoriali differenti. In particolare, il disegno campionario consente di ottenere stime trimestrali con riferimento soltanto all'intero territorio nazionale, mentre per le stime annuali sono previsti i seguenti dettagli territoriali:

1. l'intero territorio nazionale;
2. le tre grandi ripartizioni geografiche (Nord, Centro, Mezzogiorno);
3. le regioni geografiche (solamente per alcune stime più importanti);
4. le sei tipologie socio-demografiche dei comuni.

Trattandosi di un'indagine di natura campionaria, l'utilizzatore dei dati dovrà valutare l'attendibilità delle stime ottenibili, sfruttando tutte le informazioni e gli strumenti di calcolo messi a disposizione, per procedere ad una corretta interpretazione dei dati. A tale scopo, si riportano, in Appendice C, le informazioni relative alla strategia di campionamento e alla valutazione degli errori di stima, con esempi di calcolo.

APPENDICE A - IL QUESTIONARIO

Il questionario, somministrato con tecnica CATI, è strutturato in Sezioni in modo da garantire continuità di contenuto fra le domande e da facilitare la concentrazione del rispondente, al quale viene chiesto di rispondere su un certo argomento fino a che questo non sia stato del tutto esaurito e solo successivamente di passare ad un altro. All'interno del questionario sono quindi individuabili una prima fase di presentazione dell'intervista, una seconda fase in cui vengono raccolti i dati individuali ed una terza fase in cui vengono raccolti i dati sui viaggi.

La fase di presentazione rappresenta una componente cruciale dell'intervista. L'intervistatore si presenta specificando che l'indagine è effettuata per conto dell'Istat, riassume il contenuto dell'indagine e ricorda che le notizie raccolte sono coperte da segreto d'ufficio. Verifica, inoltre, che la famiglia abbia ricevuto la lettera firmata dal Presidente dell'Istat che avvertiva dell'intervista telefonica e spiegava dettagliatamente i motivi dell'indagine. Successivamente si passa a valutare l'eleggibilità della famiglia contattata. Essendo il target dell'indagine costituito dalle famiglie, si verifica in primo luogo che l'intestatario del contratto telefonico sia effettivamente una famiglia e non un'impresa, un'azienda, un ufficio o un gruppo di individui. Per evitare, inoltre, ridondanze all'interno del campione si escludono anche le dimore non abituali della famiglia, come ad esempio le seconde case.

Una volta accertata l'eleggibilità della famiglia, viene intervistata una persona, di almeno 18 anni (esclusi domestici, amici o visitatori casuali), che fornirà informazioni per sé e per ciascuno degli altri componenti della famiglia. Quindi, per ogni famiglia del campione, viene realizzata l'intervista "diretta" per un solo componente (persona di riferimento), mentre per ciascun altro componente l'intervista è di tipo "proxy".

Il questionario si compone delle seguenti sezioni:

- "Sezione generale", dove vengono rilevate le informazioni strutturali di ciascun componente della famiglia;
- "Scheda riepilogativa viaggi", dove viene riportato il numero dei viaggi conclusi da ciascun componente nel trimestre di riferimento;
- "Scheda viaggio di lavoro", dove vengono rilevate le informazioni per ciascun viaggio effettuato dai componenti della famiglia per motivi professionali;
- "Scheda viaggio di vacanza", dove vengono rilevate le informazioni per ciascun viaggio effettuato dai componenti della famiglia per motivi di vacanza/personali.

Di seguito è riportato l'elenco dei quesiti posti all'intervistato in ciascuna sezione.

APPENDICE B - ALCUNE DEFINIZIONI

Le **ripartizioni geografiche** sono una suddivisione amministrativa del territorio italiano e sono così definite:

- **Nord**:: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna
- **Centro**: Toscana, Umbria, Marche, Lazio
- **Mezzogiorno**: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

La **tipologia socio-demografica del comune (dominio)** è una suddivisione in classi dei comuni italiani, in base all'ampiezza demografica e alle caratteristiche socio-economiche:

- **comuni centro dell'area metropolitana**: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania, Cagliari;
- **comuni che gravitano intorno al centro dell'area metropolitana** come definiti sulla base dei risultati del Censimento della Popolazione;
- **altri comuni** suddivisi per dimensione demografica (oltre i 50.000 abitanti, da 10.001 a 50.000 abitanti, da 2.001 a 10.000 abitanti, fino a 2.000 abitanti).

Le caratteristiche socio-demografiche dell'individuo (stato civile, titolo di studio, condizione professionale, posizione nella professione, attività economica) fanno riferimento alla situazione al momento dell'intervista e sono quelle standard dell'Istat. In particolare:

- **l'età** è espressa in anni compiuti;
- la **condizione professionale** è quella dichiarata come unica o prevalente;
- **occupato** è chi svolge un'occupazione in proprio o alle dipendenze da cui trae un profitto o una retribuzione (utile, onorario, salario, stipendio, ecc.) o collabora con un familiare che svolge attività lavorativa in conto proprio, senza avere un regolare contratto di lavoro (coadiuvante);
- **in cerca di nuova occupazione** è chi avendo perduto una precedente occupazione è alla ricerca attiva di una nuova occupazione ed è in grado di accettarla se gli viene offerta;
- **in cerca di prima occupazione** è chi avendo concluso o sospeso o abbandonato un ciclo di studi e chi non avendo mai esercitato un'attività lavorativa è alla ricerca attiva di un'occupazione ed è in grado di accettarla se gli viene offerta;
- **casalinga** è chi si dedica prevalentemente alle cure della propria famiglia o della propria casa;
- **studente** è chi si dedica prevalentemente allo studio;
- **ritirato dal lavoro** è chi ha cessato un'attività lavorativa per raggiunti limiti di età, invalidità o altra causa; la figura di ritirato dal lavoro non coincide necessariamente con quella di pensionato in quanto non sempre il ritirato dal lavoro gode di una pensione;
- **in altra condizione** è chi si trova in condizione diversa da quelle sopra elencate, e dalla condizione di inabile al lavoro o militare in servizio di leva/servizio civile (ad es. benestante, pensionato per motivi diversi dall'attività lavorativa, detenuto agli arresti domiciliari, ecc.).

APPENDICE C - STRATEGIA DI CAMPIONAMENTO E VALUTAZIONE DEGLI ERRORI CAMPIONARI

1. Introduzione

La popolazione di interesse dell'indagine – ossia l'insieme delle unità statistiche oggetto di investigazione – è costituita dalle famiglie residenti in Italia e dagli individui che le compongono, al netto dei membri permanenti delle convivenze. Per famiglia si intende la famiglia di fatto, ossia un insieme di persone coabitanti e legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o affettivi.

L'indagine viene svolta mediante intervista telefonica e utilizza come lista di selezione l'archivio ufficiale nazionale degli abbonati alle utenze private di telefonia fissa; le unità di campionamento sono, pertanto, i numeri telefonici appartenenti a detto archivio.

Nel corso di un anno sono previste quattro rilevazioni, nei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio. Ciascuna rilevazione ha come periodo di riferimento il trimestre immediatamente precedente. Ad esempio, la rilevazione di aprile si riferisce al primo trimestre dell'anno.

Ciascuna delle quattro rilevazioni trimestrali utilizza un campione di circa 3.500 famiglie che viene selezionato in modo indipendente dai campioni delle altre tre rilevazioni.

L'indagine ha la finalità di fornire stime di parametri di diversa natura (totali, medie, rapporti, frequenze assolute e relative) con diversi riferimenti temporali e territoriali. Le stime relative ai singoli trimestri si riferiscono all'intero territorio nazionale, mentre i domini territoriali di riferimento per le stime relative all'intero anno sono:

- l'intero territorio nazionale;
- le tre grandi ripartizioni geografiche (Nord, Centro e Mezzogiorno);
- le regioni geografiche (solamente per alcune stime più importanti);
- la tipologia comunale, ottenuta suddividendo i comuni italiani in sei classi formate in base a caratteristiche socio-economiche e demografiche (sulla base della popolazione residente per l'anno di riferimento):

A, area metropolitana suddivisa in :

A1, comuni centro dell'area metropolitana: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania e Cagliari;

A2, comuni che gravitano intorno al centro dell'area metropolitana;

B, area non metropolitana suddivisa in:

B1, comuni aventi fino a 2.000 abitanti;

B2, comuni con 2.001-10.000 abitanti;

B3, comuni con 10.001-50.000 abitanti;

B4, comuni con oltre 50.000 abitanti.

2. Caratteristiche della lista di selezione

La base di campionamento adottata, ossia la lista di selezione delle unità campionarie, è l'archivio informatizzato ufficiale degli abbonati alle utenze private di telefonia fissa. Tale scelta è motivata dal fatto che le informazioni dell'archivio in oggetto sono contenute in un file che viene costantemente aggiornato sulle variazioni degli intestatari e degli indirizzi telefonici; esso è, inoltre, di agevole utilizzo per la selezione delle unità campionarie in quanto si presta facilmente alla scelta di diversi criteri di ordinamento.

Le informazioni relative a ciascun indirizzo, utilizzabili per la stratificazione delle unità della popolazione di riferimento, sono essenzialmente di tipo territoriale; esse sono: la provincia, il comune, la sezione di censimento, la via, il numero civico e infine l'ampiezza del comune di appartenenza definita sia in termini demografici sia in termini di numero di indirizzi.

I principali problemi che derivano dall'utilizzo della lista telefonica come base di campionamento per le indagini sulle famiglie, sono legati alla non perfetta coincidenza tra la popolazione oggetto d'indagine e l'insieme delle unità contenute nella lista; indicando con L ed U rispettivamente la lista e

la popolazione d'interesse, le possibili situazioni in cui gli insiemi L e U differiscono sono in generale le seguenti:

- sovracopertura, quando alcuni elementi dell'insieme L non appartengono all'insieme U;
- sottocopertura, nel caso in cui alcuni elementi di U non sono contenuti in L;
- duplicazione di alcune unità, se alcuni elementi di U sono presenti più volte in L;
- grappoli di unità, quando alcuni elementi dell'insieme L contengono grappoli di elementi dell'insieme U.

La lista telefonica utilizzata per l'indagine presenta in misura diversa tutte le situazioni elencate; i fenomeni che appaiono più rilevanti sono, tuttavia, quelli della sovracopertura e della sottocopertura. Rientrano, infatti, nel caso della sovracopertura tutti i numeri telefonici che corrispondono a seconde case oppure ad attività professionali o a pubblici esercizi, ecc.; mentre rientrano nel caso della sottocopertura tutte le famiglie non abbonate al telefono o intestatarie di numeri riservati. Rientrano, poi, nel caso III le famiglie intestatarie di più di un numero riferito all'abitazione principale e nel caso IV i numeri telefonici a cui corrispondono più famiglie.

L'effetto di ciascuna delle situazioni appena elencate è quello di modificare in modo non controllato le probabilità di inclusione delle unità della popolazione rispetto alle probabilità di inclusione teoriche assegnate alle stesse unità dal disegno di campionamento adottato. Ciò può essere causa di distorsioni nelle stime prodotte dall'indagine.

In particolare la sottocopertura determina una distorsione delle stime prodotte tanto maggiore quanto più, relativamente alle variabili d'interesse dell'indagine, le unità di U che appartengono a L sono differenti dalle unità di U non presenti in L. È possibile in parte attenuare tale effetto distorsivo ricorrendo a opportune procedure di stima, note in letteratura come stimatori di ponderazione vincolata⁶, che tengono conto di totali noti (desunti da fonti esterne all'indagine) della popolazione relativi a variabili ausiliarie correlate a quelle d'interesse.

Un effetto dovuto al fenomeno della sovracopertura, è il fatto che la numerosità realizzata del campione sia minore di quella definita nella fase di progettazione del disegno e ciò comporta un aumento di variabilità delle stime. Si tratta allora di decidere se accettare una dimensione campionaria inferiore a quella prevista o, alternativamente, ricorrere a un sovra-dimensionamento del campione o a una lista di unità sostitutive. Nelle indagini di tipo telefonico, in cui la rilevazione è affidata ad una ditta esterna si ricorre in genere alla sostituzione in quanto è necessario garantire che tale ditta svolga un numero prefissato di interviste utili. Al fine di evidenziare il fenomeno della sostituzione, nei prospetti 1 e 2 vengono presentati i tassi di sostituzione, rispettivamente per regione e per tipologia comunale, osservati nel trimestre di indagine ottobre-dicembre.

3. Disegno di campionamento

3.1 Descrizione generale

Il disegno di campionamento è un disegno stratificato a grappoli, in cui ciascun grappolo è un indirizzo telefonico presente nell'archivio di selezione. Tutti gli individui appartenenti ai grappoli campione, cioè appartenenti alle famiglie a cui corrispondono i numeri selezionati, vengono inclusi nel campione.

Gli indirizzi telefonici sono stati stratificati, all'interno di ogni regione geografica, secondo la tipologia socio-demografica dei comuni (descritta nel paragrafo 1) di appartenenza degli indirizzi. Poiché tale informazione non è presente nell'archivio di selezione, è stato necessario integrare l'archivio attribuendo ad ogni record il relativo codice di tipologia.

La determinazione del numero totale di unità campionarie e la sua allocazione tra gli strati, è in genere, per un'indagine ad obiettivi plurimi come quella in esame, un'operazione complessa. È poco realistico, infatti, pensare di poter definire un campione che assicuri prefissati livelli di precisione per tutte le stime d'interesse, considerando anche il fatto che le stime vengono prodotte con diversi riferimenti temporali e territoriali. L'allocazione ottimale delle unità del campione con riferimento ad un dato tipo di dominio può risultare contrastante con l'allocazione ottimale con riferimento ad un altro tipo di dominio territoriale. Infatti, per quanto riguarda le stime riferite all'intero territorio nazionale l'allocazione ottimale risulta vicina a quella proporzionale tra le diverse regioni; per quanto riguarda,

⁶ Noti nella letteratura in lingua anglosassone sul tema come Deville J.C. e Särndal C.E. "Calibration Estimators in Survey Sampling", *Journal of the American Statistical Association*, 87 (1992): 1013-1020.

invece, le stime riferite alle regioni, l'allocazione ottimale risulta prossima a quella che assegna a tutte le regioni un campione di uguale numerosità. È necessario quindi ricorrere a un procedimento complesso articolato in più fasi.

Dapprima, mediando tra esigenze operative e di costo ed esigenze relative all'attendibilità delle principali stime di interesse, si è definito un numero complessivo di indirizzi campione n pari a circa 3.500. Successivamente, sulla base di valutazioni dell'errore di campionamento atteso delle principali stime a livello regionale e nazionale, è stata determinata l'allocazione del campione tra le regioni; si è ottenuta in tal modo un'allocazione di compromesso tra l'allocazione uniforme e quella proporzionale al peso demografico di ciascuna regione. Infine, le numerosità campionarie regionali sono state ripartite tra le diverse tipologie di comune in modo proporzionale alla popolazione residente.

Nei prospetti 1 e 2 sono riportati, rispettivamente per regione e per tipologia di comune, le numerosità campionarie teoriche e i tassi di sostituzione riferiti alla rilevazione del quarto trimestre d'indagine; nell'ambito di ciascuna regione il tasso di sostituzione è calcolato come rapporto percentuale tra il numero di indirizzi sostituiti ed il numero teorico di indirizzi campione.

Prospetto 1 - Distribuzione regionale del campione e tassi di sostituzione - Quarto trimestre 2009

REGIONI	Indirizzi campione	Tasso di sostituzione totale (a)	Tasso di sostituzione al netto dei mancati contatti (b)
Piemonte	268	33,2	25,7
Valle d'Aosta	93	43,0	26,9
Lombardia	329	22,8	16,7
Trentino-Alto Adige	204	31,9	20,1
<i>Bolzano-Bozen</i>	99	37,4	24,2
<i>Trento</i>	105	26,7	16,2
Veneto	201	23,4	18,4
Friuli-Venezia Giulia	139	32,4	23,0
Liguria	152	35,5	26,3
Emilia-Romagna	197	26,9	18,8
Toscana	213	28,2	20,2
Umbria	103	25,2	15,5
Marche	141	30,5	19,9
Lazio	220	26,4	16,4
Abruzzo	144	25,0	17,4
Molise	95	40,0	28,4
Campania	196	34,7	27,6
Puglia	187	33,2	26,2
Basilicata	99	25,3	21,2
Calabria	158	38,0	29,1
Sicilia	213	38,0	28,6
Sardegna	149	37,6	24,2
Italia	3501	30,9	22,2

(a) Il tasso di sostituzione totale è calcolato come rapporto percentuale tra il numero di famiglie sostituite ed il numero teorico di famiglie campione. Esso esclude le sostituzioni rese necessarie dagli 'errori' di lista, molto elevati in alcune zone soprattutto per la presenza di numerici telefonici riferiti ad abitazioni non principali (seconde case).

(b) Il tasso di sostituzione al netto dei mancati contatti è calcolato come rapporto percentuale tra il numero di famiglie sostituite, depurate dalle sostituzioni per mancato contatto, ed il numero teorico di famiglie campione. Per mancato contatto con la famiglia ci si riferisce ai casi di 7 tentativi di contatto telefonico con esito 'libero', effettuati in giorni e orari diversi.

Prospetto 2 - Distribuzione del campione per tipologia di comune e tassi di sostituzione - Quarto trimestre 2009

TIPOLOGIA DEL COMUNE	Indirizzi campione	Tasso di sostituzione totale	Tasso di sostituzione al netto dei mancati contatti
Comuni centro dell'area metropolitana	419	31,0	21,5
Comuni che gravitano intorno al centro dell'area metropolitana	321	24,9	19,0
Comuni aventi fino a 2.000 abitanti	634	31,4	21,9
Comuni con 2.001-10.000 abitanti	910	32,1	24,5
Comuni con 10.001-50.000 abitanti	922	29,5	21,4
Comuni con oltre 50.000 abitanti	295	36,6	23,1
Italia	3501	30,9	22,2

3.2. Selezione del campione

L'estrazione degli indirizzi campione da ciascuno strato, ottenuto come incrocio della regione e della tipologia comunale, è stata effettuata con probabilità uguali e senza reimmissione mediante tecnica di selezione sistematica. La selezione del campione di indirizzi avviene nel seguente modo:

- per ciascuno strato si ordinano gli indirizzi dell'Archivio Telefonico delle Famiglie per ampiezza demografica del comune, strada, numero civico e piano;
- si definisce il passo di estrazione p come rapporto tra il numero di indirizzi in archivio e il numero di indirizzi da estrarre; si seleziona un numero casuale compreso tra 1 e p e si procede, poi, alla selezione degli indirizzi campione sulla base del passo di estrazione a partire dal punto di partenza casuale;
- ogni indirizzo selezionato dall'Archivio entra a far parte dell'elenco base e per ognuno di essi si selezionano i tre indirizzi successivi, che entrano a far parte dell'elenco sostitutivo; in tal modo le unità sostitutive sono le più vicine possibile dal punto di vista territoriale alle rispettive unità del campione base e quindi, presumibilmente, sono anche simili dal punto di vista delle caratteristiche socio-economiche.

4. Procedimento per il calcolo delle stime

Le stime prodotte dall'indagine sono stime del numero di viaggi e del numero di notti trascorse fuori casa per tipologia di viaggio, nonché del numero e delle caratteristiche di individui che effettuano tali viaggi.

Tali stime sono ottenute mediante uno stimatore di ponderazione vincolata (cfr. par. 2), che è il metodo di stima standard per la maggior parte delle indagini Istat sulle imprese e sulle famiglie.

Il principio su cui è basato ogni metodo di stima campionaria è che le unità appartenenti al campione rappresentino anche le unità della popolazione che non sono incluse nel campione.

Questo principio viene realizzato attribuendo a ogni unità campionaria un peso che indica il numero di unità della popolazione rappresentate dall'unità medesima. Se, ad esempio, a un'unità campionaria viene attribuito un peso pari a 100, vuol dire che questa unità rappresenta se stessa ed altre 99 unità della popolazione che non sono state incluse nel campione.

Al fine di rendere più chiara la successiva esposizione, introduciamo la seguente simbologia: d , indice di livello territoriale di riferimento delle stime; t , indice di trimestre ($t=1, \dots, 4$); j , indice di famiglia; p , indice del componente della famiglia; h , indice di strato; y , generica variabile oggetto di indagine; Y_{thjp} valore di y osservato sul componente p della famiglia j dello strato h rilevata nel trimestre t ; P_{hj} , numero di componenti della famiglia j dello strato h ; M_h , numero di famiglie residenti nello strato h ; m_h , campione di famiglie nello strato h ; H_d , numero di strati nel dominio d .

Ipotizziamo di voler stimare, con riferimento a un generico dominio d (ad esempio una regione geografica) e relativamente a un generico trimestre t , il totale della variabile y , espresso dalla seguente relazione:

$${}_dY_t = \sum_{h=1}^{H_d} \sum_{j=1}^{M_h} \sum_{p=1}^{P_{hj}} Y_{thjp} \quad (1)$$

Una stima del totale (1) è data dalla seguente espressione:

$${}_d\hat{Y}_t = \sum_{h=1}^{H_d} \hat{Y}_h = \sum_{h=1}^{H_d} \sum_{j=1}^{m_h} \sum_{p=1}^{P_{hj}} Y_{thjp} W_{thj} \quad (2)$$

in cui W_{thj} è il peso finale da attribuire alla famiglia j dello strato h e a tutti i componenti a essa appartenenti.

Dalla precedente relazione si desume, quindi, che per ottenere la stima del totale (1) occorre moltiplicare il peso finale associato a ciascuna unità campionaria per il valore della variabile y assunto da tale unità ed effettuare, a livello del dominio di interesse, la somma dei prodotti così ottenuti.

Il peso da attribuire alle unità campionarie è ottenuto per mezzo di una procedura complessa che ha le seguenti finalità:

- correggere l'effetto distorsivo dovuto agli errori di lista e al fenomeno della mancata risposta totale;

• tenere conto della conoscenza di alcuni totali noti sulla popolazione oggetto di studio, nel senso che le stime campionarie di tali totali devono coincidere con i rispettivi valori noti. Nell'indagine in oggetto i totali noti⁷ sono:

- popolazione residente per le 6 tipologie comunali;
- popolazione residente per sesso nelle 20 regioni italiane;
- popolazione residente per 8 classi di età⁸;
- famiglie unipersonali di età inferiore a 65 anni, per sesso;
- famiglie unipersonali di 65 anni e più, per sesso;
- famiglie con più di un componente per classi di ampiezza⁹

Indicando, quindi, con ${}_kX$ il totale noto della k-ma variabile ($k=1\dots K$) ausiliaria e con ${}_kX_{thjp}$ il valore assunto dalla k-ma variabile ausiliaria per l'individuo rispondente $thjp$, la condizione sopra descritta è espressa dalla seguente uguaglianza:

$${}_kX_t = \hat{X}_t = \sum_{h=1}^H \sum_{j=1}^{m_h} \sum_{p=1}^{P_{hj}} {}_kX_{thjp} W_{thj} \quad k=1\dots K.$$

La procedura per la costruzione dei pesi finali da attribuire alle unità campionarie, è articolata nelle seguenti fasi :

viene dapprima calcolato il peso base (o peso diretto), ottenuto come reciproco della probabilità di inclusione di ogni unità campionaria;

si calcola quindi il fattore correttivo che consente di soddisfare la condizione di uguaglianza tra i totali noti della popolazione e le corrispondenti stime campionarie;

il peso finale è dato dal prodotto del peso base per i fattori correttivi sopra indicati.

Il fattore correttivo del punto 2) è ottenuto mediante la risoluzione di un problema di minimo vincolato, in cui la funzione da minimizzare è la distanza tra i pesi base ed i pesi finali e i vincoli sono definiti dalla condizione che le stime campionarie dei totali di popolazione sopra definiti coincidano con i valori noti degli stessi.

Con riferimento all'intero anno, i parametri d'interesse possono essere sia dei totali annui, ${}_dY$, che delle medie annue di dati trimestrali ${}_d\bar{Y}$. I totali annui - ottenuti come somma dei totali (1), relativi ai quattro trimestri - si riferiscono al totale annuo dei viaggi ed al totale annuo delle notti trascorse fuori casa per viaggi. Le medie annue di dati trimestrali - ottenute come media aritmetica dei totali (1) - si riferiscono, invece, al numero medio di persone che viaggiano nel trimestre. Con riferimento al generico dominio d , le stime dei suddetti parametri, ${}_dY$ e ${}_d\bar{Y}$, si ottengono rispettivamente mediante le seguenti espressioni:

$${}_d\hat{Y} = \sum_{t=1}^4 {}_d\hat{Y}_t, \quad (3)$$

$${}_d\hat{\bar{Y}} = \frac{1}{4} \sum_{t=1}^4 {}_d\hat{Y}_t \quad (4)$$

Alcuni parametri d'interesse, infine, sono dati dal rapporto tra totali; in tal caso la stima può essere ottenuta come rapporto tra i totali stimati:

$${}_d\hat{R} = \frac{{}_d\hat{Y}_1}{{}_d\hat{Y}_2}.$$

⁷ I primi tre totali sono desunti da fonti demografiche (anagrafiche), mentre i totali riferiti alle famiglie derivano da stime dell'indagine annuale multiscope "Aspetti della vita quotidiana".

⁸ Le classi di età considerate sono: 0-5 anni, 6-14 anni, 15-24 anni, 25-34 anni, 35-44 anni, 45-54 anni, 55-64 anni, 65 anni e più.

⁹ Le classi di ampiezza considerate sono: 2 componenti e 3 componenti e più.

5. Valutazione del livello di precisione delle stime

Le principali statistiche di interesse per valutare la variabilità campionaria delle stime prodotte dall'indagine sono l'errore di campionamento assoluto e l'errore di campionamento relativo.

Indicando con $\hat{Var}({}_d\hat{Y}_t)$ la stima della varianza della stima ${}_d\hat{Y}_t$, riferita al dominio d e al trimestre di indagine t , la stima dell'errore di campionamento assoluto di ${}_d\hat{Y}_t$ si può ottenere mediante la seguente espressione:

$$\hat{\sigma}({}_d\hat{Y}_t) = \sqrt{\hat{Var}({}_d\hat{Y}_t)} \quad (5)$$

La stima dell'errore di campionamento relativo di ${}_d\hat{Y}_t$, è invece definita dall'espressione:

$$\hat{\varepsilon}({}_d\hat{Y}_t) = \frac{\sqrt{\hat{Var}({}_d\hat{Y}_t)}}{{}_d\hat{Y}_t} \quad (6)$$

La stima della varianza, $\hat{Var}({}_d\hat{Y}_t)$, viene ottenuta come somma della stima della varianza dei singoli strati appartenenti al dominio d ; in simboli:

$$\hat{Var}({}_d\hat{Y}_t) = \sum_{h=1}^{H_d} \hat{Var}(\hat{Y}_{th}) = \sum_{h=1}^{H_d} M_h^2 \frac{M_h - m_h}{m_h M_h} \sum_{j=1}^{m_h} \frac{(e_{thj} - \bar{e}_{th})^2}{m_h - 1} \quad (7)$$

dove

$$e_{thj} = \sum_{p=1}^{P_{hj}} Y_{thjp} - \hat{\beta} \sum_{p=1}^{P_{hj}} X_{thjp} \quad \bar{e}_{th} = \frac{1}{m_h} \sum_{j=1}^{m_h} e_{thj};$$

in cui X_{thjp} è il vettore delle K variabili ausiliarie utilizzate per la costruzione dello stimatore di ponderazione vincolata e $\hat{\beta}$ è il vettore dei coefficienti di regressione stimati del modello lineare che lega la variabile Y alle variabili ausiliarie X .

Passiamo ora alla descrizione della metodologia per il calcolo degli errori di campionamento delle stime dei parametri riferiti all'intero anno. Per quanto riguarda la stima di un totale annuo (3), l'errore di campionamento assoluto e relativo, tenendo presente l'indipendenza dei quattro campioni, sono espressi rispettivamente dalle seguenti formule

$$\hat{\sigma}({}_d\hat{Y}) = \sqrt{\sum_{t=1}^4 \hat{Var}({}_d\hat{Y}_t)} \quad \hat{\varepsilon}({}_d\hat{Y}) = \frac{\hat{\sigma}({}_d\hat{Y})}{{}_d\hat{Y}} \quad (8)$$

Per quanto riguarda, invece, la stima di una media annua (4), l'errore di campionamento assoluto e relativo sono dati rispettivamente dalle seguenti espressioni:

$$\hat{\sigma}({}_d\hat{\bar{Y}}) = \frac{1}{4} \sqrt{\sum_{t=1}^4 \hat{Var}({}_d\hat{Y}_t)} \quad \hat{\varepsilon}({}_d\hat{\bar{Y}}) = \frac{\hat{\sigma}({}_d\hat{\bar{Y}})}{{}_d\hat{\bar{Y}}} \quad (9)$$

Infine, la stima degli errori relativi di stime di rapporto tra totali, nell'ipotesi semplificatrice che il rapporto sia indipendente dal valore del denominatore, può essere ottenuta come

$$\hat{\varepsilon}({}_d\hat{R}) = \sqrt{\hat{\varepsilon}^2({}_d\hat{Y}_1) - \hat{\varepsilon}^2({}_d\hat{Y}_2)} \quad (10)$$

Gli errori campionari consentono di valutare il grado di precisione delle stime; inoltre, l'errore assoluto permette di costruire l'intervallo di confidenza che con una certa fiducia P contiene il parametro di interesse. Con riferimento ad una generica stima \hat{Y} tale intervallo assume la seguente forma:

$$\{\hat{Y} - k\hat{\sigma}(\hat{Y}), \hat{Y} + k\hat{\sigma}(\hat{Y})\} \quad (11)$$

Nella (11) il valore di k dipende dal valore fissato per P ; ad esempio, per $P=0,95$ si ha $k=2$.

6. Presentazione sintetica degli errori campionari

Poiché a ciascuna stima ${}_d\hat{Y}_t$ corrisponde un errore campionario relativo $\hat{\varepsilon}({}_d\hat{Y}_t)$, per consentire un uso corretto delle informazioni prodotte dall'indagine sarebbe necessario pubblicare per ogni stima anche il corrispondente errore di campionamento relativo. Tuttavia sia per limiti di tempo e di costi di elaborazione, sia perché le tavole di pubblicazione risulterebbero appesantite e di non facile consultazione per l'utente finale, non è possibile pubblicare anche tutti gli errori di campionamento delle stime fornite. Inoltre, non sarebbero comunque disponibili gli errori delle stime non pubblicate, che l'utente può ricavare in modo autonomo.

Al fine di permettere comunque una valutazione della variabilità campionaria di tutte le stime d'interesse, si ricorre a una presentazione sintetica degli errori relativi basata su modelli regressivi; ossia fondata sulla determinazione di una funzione matematica che mette in relazione ciascuna stima con il proprio errore di campionamento. L'approccio utilizzato per la costruzione dei modelli è differente a seconda che la variabile oggetto di stima sia qualitativa ovvero quantitativa. Infatti, mentre per le stime di frequenze assolute (o relative) riferite alle modalità di variabili qualitative è possibile utilizzare modelli che hanno un fondamento teorico, secondo cui gli errori relativi delle stime di frequenze assolute sono funzione decrescente dei valori delle stime stesse, per le stime di totali di variabili quantitative il problema è piuttosto complesso, dal momento che non è stata ancora elaborata un'adeguata base teorica per l'interpolazione degli errori campionari delle stime in questione. L'approccio adottato per trattare il caso di variabili quantitative è pertanto di tipo empirico ed è fondato sull'evidenza sperimentale che l'errore assoluto di un totale è una funzione crescente del totale stesso.

Vengono di seguito descritti i modelli adottati per i due differenti gruppi di variabili.

6.1. Presentazione sintetica degli errori campionari per stime di frequenze riferite agli individui

Il modello utilizzato per le stime di frequenze assolute, con riferimento al generico dominio d e al trimestre t , è del tipo seguente:

$$\log \hat{\varepsilon}^2({}_d\hat{Y}_t) = a + b \log({}_d\hat{Y}_t) \quad (12)$$

in cui i parametri a e b vengono stimati utilizzando il metodo dei minimi quadrati. Dall'analisi dei coefficienti di regressione ottenuti è emerso che i coefficienti relativi al primo, secondo e quarto trimestre sono sostanzialmente simili tra loro, mentre differenti risultati si ottengono per il terzo trimestre; pertanto, per semplicità, vengono presentati solamente i risultati relativi al primo e al terzo trimestre. È stato inoltre stimato un modello analogo al (12) con riferimento alla media dei 4 trimestri.

I prospetti 3 (per i trimestri) e 4 (per la media dei 4 trimestri) riportano i valori dei coefficienti a e b e dell'indice di determinazione R^2 delle funzioni utilizzate per l'interpolazione degli errori campionari delle stime di frequenze riferite agli individui, per area territoriale.

Inoltre, allo scopo di facilitare il calcolo degli errori campionari, nei prospetti 5 (per i trimestri) e 6 (per la media dei 4 trimestri) sono riportati, per area territoriale, i valori interpolati degli errori campionari relativi percentuali di alcuni valori tipici assunti dalle stime di frequenze assolute.

La prima colonna dei prospetti riporta K valori crescenti delle stime ${}_d\hat{Y}_t^k$ ($k=1,\dots,K$), la seconda riporta i rispettivi errori relativi interpolati $\hat{\varepsilon}({}_d\hat{Y}_t^k)$. Le informazioni contenute nei prospetti permettono di calcolare l'errore relativo di una generica stima di frequenza assoluta mediante due procedimenti che risultano di facile applicazione, anche se conducono a risultati meno precisi di quelli ottenibili mediante l'applicazione diretta dell'espressione (12).

Il metodo consiste nell'approssimare l'errore relativo $\hat{\varepsilon}({}_d\hat{Y}_t)$ della stima di interesse ${}_d\hat{Y}_t$ con l'errore relativo corrispondente al livello stima, presente nel prospetto (5 o 6) che più si avvicina al valore della stima ${}_d\hat{Y}_t$.

Con il secondo metodo, l'errore campionario della stima ${}_d\hat{Y}_t$, si ricava mediante la seguente espressione:

$$\hat{\varepsilon}({}_d\hat{Y}_t) = \hat{\varepsilon}({}_d\hat{Y}_t^{k-1}) + \frac{\hat{\varepsilon}({}_d\hat{Y}_t^k) - \hat{\varepsilon}({}_d\hat{Y}_t^{k-1})}{{}_d\hat{Y}_t^k - {}_d\hat{Y}_t^{k-1}} ({}_d\hat{Y}_t - {}_d\hat{Y}_t^{k-1}) \quad (13)$$

dove: ${}_d\hat{Y}_t^{k-1}$ e ${}_d\hat{Y}_t^k$ sono i valori delle stime entro i quali è compresa la stima d'interesse ${}_d\hat{Y}_t$ e $\hat{\varepsilon}({}_d\hat{Y}_t^{k-1})$ e $\hat{\varepsilon}({}_d\hat{Y}_t^k)$ sono i corrispondenti errori relativi presenti nel prospetto.

6.2. Presentazione sintetica degli errori campionari per stime di totali riferiti ai viaggi e alle notti

Il modello utilizzato per le stime del totale del numero di viaggi e di notti, con riferimento al generico dominio d e al trimestre t, è del tipo seguente:

$$\hat{\sigma}({}_d\hat{Y}_t) = a + b \cdot {}_d\hat{Y}_t + c \cdot {}_d\hat{Y}_t^2 \quad (14)$$

dove i parametri a, b e c vengono stimati utilizzando il metodo dei minimi quadrati, adattando il modello (14) a una nuvola di punti costituita da un consistente numero di coppie $(\hat{\sigma}({}_d\hat{Y}_t), {}_d\hat{Y}_t)$. In considerazione del fatto che il modello (14) è di tipo empirico, l'insieme delle stime ${}_d\hat{Y}_t$ utilizzate per interpolare il modello è stato determinato in modo da includere la maggior parte delle stime pubblicate. Al fine di ottenere un migliore adattamento alla nuvola di punti, è stato interpolato un modello - con riferimento ad ogni trimestre e con riferimento all'intero anno - per ciascuno dei seguenti sottogruppi di stime:

- numero di notti per viaggi di lavoro;
- numero di notti per viaggi di vacanza;
- numero totale di notti in viaggio;
- numero di viaggi di lavoro;
- numero di viaggi di vacanza;
- numero totale di viaggi.

Analogamente al caso precedente, dall'analisi dei coefficienti di regressione ottenuti è emerso che i coefficienti relativi al primo, al secondo e al quarto trimestre sono sostanzialmente uguali tra loro, mentre differiscono significativamente da quelli relativi al terzo trimestre; ciò è spiegabile considerando il fatto che i fenomeni indagati presentano andamenti difforni nel terzo trimestre rispetto agli altri tre.

Al fine di non appesantire la trattazione vengono qui, pertanto, riportati i risultati relativi al primo trimestre, al terzo trimestre e all'intero anno.

I prospetti 7, 9 e 11 (per le stime relative alle notti e ai viaggi) riportano i valori dei coefficienti a, b, c e dell'indice di determinazione R² dei modelli utilizzati per l'interpolazione degli errori campionari delle stime di totali per area territoriale e per ciascuno dei sei tipi di stime sopra elencati, con riferimento al primo trimestre, al terzo trimestre e all'intero anno.

Nel paragrafo successivo verrà illustrato come calcolare l'errore di campionamento assoluto e relativo di una stima a partire dalle informazioni contenute nei prospetti.

Utilizzando i valori stimati dei parametri del modello (14) e dividendo ambo i membri del modello per il valore della stima, \hat{Y}_t , si perviene alla seguente equazione di secondo grado:

$$a + [b - \varepsilon(\hat{Y}_t)] \hat{Y}_t + c(\hat{Y}_t)^2 = 0$$

la cui radice positiva è espressa dalla seguente formula:

$$\hat{Y}_t = \frac{-[b - \varepsilon(\hat{Y}_t)] - \sqrt{[b - \varepsilon(\hat{Y}_t)]^2 - 4ac}}{2c} \quad (15)$$

Nei prospetti 8, 10 e 12 (per le stime relative alle notti e ai viaggi) vengono riportati i valori delle stime \hat{Y}_t^* ottenuti sulla base della relazione (15) in corrispondenza di alcuni valori tipici prefissati dell'errore relativo percentuale, indicati come $\varepsilon^* = \varepsilon(\hat{Y}_t^*)$; le stime con valori superiori a \hat{Y}_t^* presentano valori dell'errore relativo inferiori a ε^* , mentre le stime che assumono valori inferiori a \hat{Y}_t^* presentano valori dell'errore relativo superiori a ε^* . In tali prospetti, articolati per gruppo di stime, trimestre e area territoriale, i valori prefissati di ε^* sono: 1, 5, 10, 15, 20, 25 e 30%. L'utilizzo di tali prospetti verrà meglio chiarito nel paragrafo seguente attraverso un esempio numerico.

Prospetto 3 - Valori dei coefficienti a, b e di R^2 delle funzioni utilizzate per l'interpolazione degli errori campionari delle stime di frequenze assolute riferite agli individui per aree territoriali - Trimestri – Anno 2009

AREE TERRITORIALI	Trimestri 1,2,e 4			Trimestre 3		
	a	b	R^2	a	b	R^2
Nord	11,70631	-1,20591	92,7	10,95603	-1,14169	91,9
Centro	10,58817	-1,14800	89,4	9,86751	-1,08285	89,7
Mezzogiorno	11,15267	-1,18681	90,4	10,18371	-1,10538	89,3
Italia	11,77505	-1,20427	93,0	11,13746	-1,15215	92,8

Prospetto 4 - Valori dei coefficienti a, b e di R^2 delle funzioni utilizzate per l'interpolazione degli errori campionari delle stime di frequenze assolute riferite agli individui per aree territoriali - Media dei 4 trimestri – Anno 2009

AREE TERRITORIALI	a	b	R^2
Nord	10,25183	-1,18783	93,6
Centro	9,09837	-1,12181	91,6
Mezzogiorno	10,24829	-1,20505	93,3
Italia	10,43531	-1,19478	93,9

Prospetto 5 - Valori interpolati degli errori relativi percentuali delle stime di frequenze assolute riferite agli individui per aree territoriali - Trimestri – Anno 2009

STIME	Trimestri 1,2 e 4				Trimestre 3			
	Aree territoriali				Aree territoriali			
	Nord	Centro	Mezzogiorno	Italia	Nord	Centro	Mezzogiorno	Italia
50.000	44,3	41,5	40,2	49,5	41,9	40,0	38,3	42,7
60.000	40,2	37,5	36,4	44,6	38,1	36,3	35,0	38,8
70.000	37,0	34,4	33,5	40,9	35,2	33,5	32,5	35,8
80.000	34,5	31,9	31,2	37,9	32,9	31,2	30,4	33,4
90.000	32,4	29,9	29,2	35,4	30,9	29,3	28,7	31,5
100.000	30,6	28,2	27,6	33,4	29,3	27,7	27,3	29,8
200.000	21,1	19,1	19,0	22,5	20,5	19,2	19,4	20,8
300.000	17,0	15,2	15,2	17,8	16,7	15,5	15,9	16,9
400.000	14,5	13,0	13,0	15,1	14,4	13,3	13,8	14,6
500.000	12,9	11,5	11,5	13,3	12,8	11,9	12,3	13,0
750.000	10,4	9,1	9,3	10,6	10,4	9,6	10,1	10,5
1.000.000	8,9	7,8	7,9	9,0	9,0	8,2	8,8	9,1
2.000.000	6,1	5,3	5,4	6,1	6,3	5,7	6,2	6,3
3.000.000	4,9	4,2	4,4	4,8	5,1	4,6	5,1	5,1
4.000.000	4,2	3,6	3,7	4,1	4,4	4,0	4,4	4,4
5.000.000	3,8	3,2	3,3	3,6	3,9	3,5	4,0	3,9
7.500.000	3,0	2,5	2,7	2,8	3,2	2,8	3,3	3,2
10.000.000	2,6	2,2	2,3	2,4	-	-	-	2,8
15.000.000	-	-	-	1,9	-	-	-	2,2
20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1,9
25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1,7

Prospetto 6 - Valori interpolati degli errori relativi percentuali delle stime di frequenze assolute riferite agli individui per aree territoriali - Media dei 4 trimestri – Anno 2009

STIME	Aree territoriali			
	Nord	Centro	Mezzogiorno	Italia
20.000	42,5	35,5	37,7	45,8
30.000	33,8	28,5	30,2	36,3
40.000	28,7	24,3	25,8	30,7
50.000	25,3	21,6	22,8	27,0
60.000	22,9	19,5	20,7	24,3
70.000	21,0	17,9	19,0	22,3
80.000	19,4	16,7	17,7	20,6
90.000	18,2	15,6	16,6	19,3
100.000	17,1	14,8	15,6	18,1
200.000	11,6	10,1	10,7	12,2
300.000	9,2	8,1	8,6	9,6
400.000	7,8	6,9	7,3	8,2
500.000	6,9	6,1	6,5	7,2
750.000	5,5	4,9	5,2	5,7
1.000.000	4,7	4,2	4,4	4,8
2.000.000	3,2	2,9	3,0	3,2
3.000.000	2,5	2,3	2,4	2,6
4.000.000	2,1	2,0	2,1	2,2
5.000.000	1,9	1,7	1,8	1,9
7.500.000	1,5	1,4	1,5	1,5
10.000.000	1,3	1,2	1,3	1,3
15.000.000	1,0	1,0	1,0	1,0
20.000.000	-	-	-	0,9

Prospetto 7 - Valori dei coefficienti a, b, c e di R² delle funzioni utilizzate per l'interpolazione degli errori campionari delle stime di totali per gruppi di stime, trimestre e anno, aree territoriali - Stime del numero di notti – Anno 2009

Notti – lavoro				
AREE TERRITORIALI	a	b	c	R ²
Gennaio-marzo				
Nord	46.278,941	0,388383	-0,000000041012	90,4
Centro	22.908,792	0,740351	-0,000000135191	88,8
Mezzogiorno	21.303,085	0,452075	-0,000000091117	96,8
Italia	107.662,367	0,290412	-0,000000015398	89,0
Luglio-settembre				
Nord	60.603,576	0,442747	-0,000000024543	84,5
Centro	28.116,187	0,680537	-0,000000059790	96,2
Mezzogiorno	-4.998,707	0,654988	-0,000000051825	88,6
Italia	202.238,291	0,342060	-0,000000009804	90,6
Anno				
Nord	165.459,273	0,239302	-0,000000005817	86,5
Centro	148.413,822	0,342507	-0,000000011905	94,2
Mezzogiorno	141.162,827	0,328868	-0,000000010706	77,8
Italia	408.893,027	0,164836	-0,000000001683	88,7
Notti – vacanze				
AREE TERRITORIALI	a	b	c	R ²
Gennaio-marzo				
Nord	196.473,072	0,169611	-0,000000002113	82,9
Centro	81.725,431	0,196765	-0,000000007121	92,7
Mezzogiorno	94.596,462	0,248432	-0,000000007754	83,4
Italia	280.336,767	0,116994	-0,000000000818	86,9
Luglio-settembre				
Nord	652.004,620	0,071720	-0,000000000163	90,3
Centro	375.819,176	0,122078	-0,000000000640	91,1
Mezzogiorno	332.696,386	0,166479	-0,000000000630	86,9
Italia	900.579,528	0,060542	-0,000000000065	89,3
Anno				
Nord	801.598,885	0,060641	-0,000000000088	91,5
Centro	440.078,385	0,095080	-0,000000000336	91,9
Mezzogiorno	483.590,066	0,139504	-0,000000000279	80,9
Italia	1.197.727,936	0,050099	-0,000000000032	88,2
Notti - totali				
AREE TERRITORIALI	a	b	c	R ²
Gennaio-marzo				
Nord	233.142,328	0,153683	-0,000000001654	85,1
Centro	107.519,870	0,216804	-0,000000007328	90,9
Mezzogiorno	113.434,097	0,217069	-0,000000005433	86,0
Italia	339.254,553	0,106587	-0,000000000638	89,1
Luglio-settembre				
Nord	682.824,482	0,072587	-0,000000000159	91,4
Centro	436.257,404	0,120238	-0,000000000608	91,5
Mezzogiorno	411.788,839	0,158461	-0,000000000570	87,7
Italia	1.021.421,836	0,059489	-0,000000000061	90,6
Anno				
Nord	877.447,938	0,060159	-0,000000000084	92,2
Centro	526.625,457	0,093173	-0,000000000309	92,2
Mezzogiorno	570.655,707	0,131846	-0,000000000254	80,7
Italia	1.353.885,335	0,048722	-0,000000000030	89,2

Prospetto 8 - Valori dei totali corrispondenti ad alcuni valori tipici degli errori relativi percentuali per gruppi di stime, trimestre e anno, aree territoriali - Stime del numero di notti – Anno 2009

Notti – lavoro							
AREE TERRITORIALI	1%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Gennaio-marzo							
Nord	9.346.756	8.385.288	7.188.554	6.000.496	4.827.072	3.680.739	2.590.607
Centro	5.433.554	5.139.461	4.772.152	4.405.262	4.038.904	3.673.234	3.308.473
Mezzogiorno	4.899.405	4.465.055	3.923.541	3.384.296	2.848.548	2.318.569	1.798.955
Italia	18.587.026	16.048.797	12.907.664	9.830.100	6.886.916	4.264.197	2.351.169
Luglio-settembre							
Nord	17.771.420	16.155.499	14.140.012	12.131.648	10.134.485	8.156.306	6.213.683
Centro	11.256.647	10.590.268	9.757.796	8.926.026	8.095.173	7.265.546	6.437.610
Mezzogiorno	12.437.656	11.665.320	10.699.796	9.734.124	8.768.254	7.802.114	6.835.588
Italia	34.469.456	30.467.951	25.499.735	20.592.392	15.796.410	11.227.680	7.168.097
Anno							
Nord	40.127.940	33.394.503	25.081.363	17.022.779	9.691.369	4.492.446	2.243.555
Centro	28.369.693	25.067.617	20.964.986	16.907.728	12.934.287	9.135.175	5.741.760
Mezzogiorno	30.220.588	26.544.750	21.977.651	17.462.456	13.047.624	8.855.669	5.221.599
Italia	94.551.635	71.612.022	44.033.285	20.603.361	8.316.929	4.415.828	2.919.047
Notti – vacanze							
AREE TERRITORIALI	1%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Gennaio-marzo							
Nord	76.734.367	58.193.677	35.552.662	15.339.814	4.837.721	2.304.431	1.471.720
Centro	26.657.744	21.152.635	14.386.372	8.001.496	3.168.192	1.306.764	752.578
Mezzogiorno	31.140.387	26.058.325	19.759.481	13.591.574	7.808.285	3.393.138	1.497.301
Italia	133.331.978	85.866.671	31.608.637	7.206.214	3.271.797	2.081.062	1.521.497
Luglio-settembre							
Nord	387.787.813	158.074.549	20.601.336	8.189.025	5.050.144	3.645.001	2.850.337
Centro	178.417.712	117.617.298	46.993.374	10.790.653	4.645.732	2.895.913	2.096.455
Mezzogiorno	250.600.662	187.785.030	110.357.893	39.533.492	8.551.361	3.870.452	2.463.108
Italia	796.398.974	224.344.114	22.025.899	9.994.593	6.438.416	4.745.734	3.757.080
Anno							
Nord	589.188.365	173.049.017	19.512.578	8.892.445	5.731.241	4.224.904	3.344.815
Centro	257.952.786	143.129.112	29.586.437	7.654.147	4.139.462	2.823.365	2.140.040
Mezzogiorno	468.631.155	326.638.988	153.156.237	26.887.394	7.719.339	4.329.277	2.997.497
Italia	1.279.227.040	194.775.480	23.642.628	11.943.314	7.976.497	5.985.848	4.789.860
Notti – totali							
AREE TERRITORIALI	1%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Gennaio-marzo							
Nord	88.444.131	64.845.570	36.328.492	13.036.405	4.355.911	2.327.524	1.565.689
Centro	28.732.071	23.390.116	16.812.316	10.512.135	5.144.968	2.185.016	1.171.486
Mezzogiorno	38.650.973	31.413.449	22.475.288	13.851.184	6.402.353	2.452.324	1.263.254
Italia	154.727.029	94.274.031	28.781.451	7.077.913	3.545.850	2.341.181	1.744.004
Luglio-settembre							
Nord	404.465.820	167.746.894	22.081.783	8.666.315	5.323.775	3.835.598	2.996.295
Centro	185.322.989	121.518.566	48.206.523	11.810.640	5.258.828	3.310.660	2.407.273
Mezzogiorno	263.426.487	194.169.601	109.268.143	35.324.824	8.841.471	4.379.177	2.876.075
Italia	826.746.377	227.754.998	24.317.840	11.200.028	7.246.410	5.352.260	4.242.291
Anno							
Nord	610.775.266	178.461.063	21.081.325	9.678.575	6.250.998	4.612.543	3.653.752
Centro	274.925.775	150.778.966	31.669.355	8.841.379	4.861.223	3.336.032	2.536.580
Mezzogiorno	483.542.008	328.514.486	141.066.193	23.616.828	8.126.459	4.780.536	3.376.393
Italia	1.330.373.541	192.569.453	26.008.578	13.315.657	8.933.865	6.719.729	5.384.542

Prospetto 9 - Valori dei coefficienti a, b, c e di R² delle funzioni utilizzate per l'interpolazione degli errori campionari delle stime di totali per gruppi di stime, trimestre e anno, aree territoriali - Stime del numero di viaggi – Anno 2009

Viaggi – lavoro				
AREE TERRITORIALI	a	b	c	R ²
Gennaio-marzo				
Nord	9.991,399	0,379222	-0,000000102527	96,2
Centro	7.144,712	0,404212	-0,000000326081	91,8
Mezzogiorno	6.403,075	0,336043	-0,000000162706	96,7
Italia	14.994,385	0,241772	-0,000000036016	96,0
Luglio-settembre				
Nord	14.012,432	0,262007	-0,000000073923	96,2
Centro	3.001,417	0,542770	-0,000000302046	98,1
Mezzogiorno	9.342,502	0,251971	-0,000000136869	91,8
Italia	17.129,509	0,201169	-0,000000028728	96,3
Anno				
Nord	26.345,881	0,176567	-0,000000012493	95,9
Centro	14.774,554	0,238639	-0,000000038181	96,1
Mezzogiorno	17.248,126	0,179465	-0,000000024422	93,8
Italia	35.716,077	0,114900	-0,000000004147	95,8
Viaggi – vacanza				
AREE TERRITORIALI	a	b	c	R ²
Gennaio-marzo				
Nord	33.472,254	0,171865	-0,000000011298	92,2
Centro	16.621,993	0,234839	-0,000000042776	95,0
Mezzogiorno	11.180,742	0,298238	-0,000000033487	91,5
Italia	45.641,593	0,129539	-0,000000004341	91,3
Luglio-settembre				
Nord	57.846,716	0,090279	-0,000000002187	91,9
Centro	32.554,138	0,132493	-0,000000009194	92,1
Mezzogiorno	33.768,427	0,142364	-0,000000009143	92,0
Italia	77.293,871	0,066338	-0,000000000932	91,4
Anno				
Nord	87.530,329	0,063309	-0,000000000828	89,4
Centro	54.332,207	0,092920	-0,000000002840	91,1
Mezzogiorno	46.536,576	0,102470	-0,000000003240	89,7
Italia	118.867,739	0,046497	-0,000000000331	89,5
Viaggi – totali				
AREE TERRITORIALI	a	b	c	R ²
Gennaio-marzo				
Nord	31.809,562	0,170867	-0,000000010060	92,1
Centro	16.741,247	0,219735	-0,000000035283	94,3
Mezzogiorno	11.587,725	0,270474	-0,000000026794	91,6
Italia	40.662,844	0,125655	-0,000000003811	92,0
Luglio-settembre				
Nord	50.343,809	0,091122	-0,000000002176	91,2
Centro	30.451,312	0,138614	-0,000000009300	90,3
Mezzogiorno	28.464,610	0,138202	-0,000000008392	91,6
Italia	64.735,974	0,067481	-0,000000000929	90,7
Anno				
Nord	58.473,330	0,076491	-0,000000000840	87,2
Centro	37.925,596	0,112051	-0,000000002937	88,1
Mezzogiorno	33.254,651	0,124476	-0,000000003187	85,2
Italia	74.113,038	0,057106	-0,000000000342	86,8

Prospetto 10 - Valori dei totali corrispondenti ad alcuni valori tipici degli errori relativi percentuali per gruppi di stime, trimestre e anno, aree territoriali - Stime del numero di viaggi – Anno 2009

Viaggi – lavoro							
AREE TERRITORIALI	1%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Gennaio-marzo							
Nord	3.628.091	3.241.155	2.758.734	2.278.501	1.802.128	1.333.456	883.053
Centro	1.226.800	1.106.081	955.858	806.758	659.486	515.436	377.614
Mezzogiorno	2.023.331	1.780.146	1.477.374	1.176.873	880.809	594.971	337.967
Italia	6.499.334	5.401.727	4.039.440	2.702.167	1.447.445	541.037	225.936
Luglio-settembre							
Nord	3.463.774	2.932.583	2.274.891	1.631.379	1.023.931	524.102	248.584
Centro	1.769.486	1.637.508	1.472.650	1.307.962	1.143.517	979.435	815.930
Mezzogiorno	1.805.705	1.520.544	1.168.743	827.513	512.819	268.563	139.256
Italia	6.742.795	5.372.985	3.683.445	2.069.275	792.788	298.403	165.371
Anno							
Nord	13.489.148	10.335.072	6.455.468	2.863.115	790.858	339.201	209.021
Centro	6.052.231	5.017.772	3.734.715	2.477.728	1.307.872	490.830	212.645
Mezzogiorno	7.039.384	5.431.221	3.458.082	1.637.747	519.269	226.734	139.172
Italia	25.628.642	16.180.422	5.237.024	917.990	411.447	262.257	192.129
Viaggi – vacanze							
AREE TERRITORIALI	1%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Gennaio-marzo							
Nord	14.530.305	11.054.085	6.796.549	2.942.169	879.249	404.706	255.472
Centro	5.329.088	4.409.201	3.270.994	2.162.975	1.151.814	470.850	222.571
Mezzogiorno	8.646.106	7.457.762	5.975.744	4.500.931	3.043.338	1.643.644	552.119
Italia	27.916.052	18.881.092	8.102.869	1.651.825	623.786	373.855	265.953
Luglio-settembre							
Nord	37.415.876	19.757.059	3.380.218	936.499	521.789	360.395	275.038
Centro	13.584.374	9.351.506	4.348.568	1.156.776	454.144	271.282	192.315
Mezzogiorno	14.728.373	10.455.760	5.327.003	1.549.090	539.688	305.785	211.620
Italia	61.767.566	21.397.927	2.166.230	914.566	575.966	419.954	330.359
Anno							
Nord	65.975.568	21.084.441	2.269.373	1.000.127	637.887	467.880	369.331
Centro	29.839.708	16.287.937	3.301.589	910.601	500.747	343.752	261.435
Mezzogiorno	29.037.170	17.038.817	4.190.355	921.250	469.819	313.283	234.689
Italia	113.480.826	14.385.923	2.191.978	1.144.259	773.078	583.553	468.614
Viaggi – totali							
AREE TERRITORIALI	1%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Gennaio-marzo							
Nord	16.185.735	12.271.983	7.467.677	3.095.614	845.192	383.298	241.777
Centro	6.023.184	4.907.396	3.528.073	2.192.841	1.023.108	382.548	192.316
Mezzogiorno	9.765.700	8.280.762	6.429.699	4.590.548	2.785.499	1.142.632	306.957
Italia	30.695.043	20.375.209	8.056.113	1.374.500	532.414	323.802	232.054
Luglio-settembre							
Nord	37.882.702	20.047.703	3.184.563	829.617	458.193	315.508	240.418
Centro	14.062.499	9.860.580	4.830.009	1.298.101	463.513	267.414	186.678
Mezzogiorno	15.494.945	10.823.191	5.203.797	1.268.349	434.921	249.919	174.350
Italia	62.981.332	21.986.719	1.888.801	777.690	486.842	354.043	278.103
Anno							
Nord	79.996.594	33.596.776	2.298.481	788.358	471.920	336.457	261.359
Centro	35.111.108	21.719.751	6.188.942	932.124	425.183	273.333	201.154
Mezzogiorno	36.209.514	23.808.034	8.858.242	1.140.470	432.427	263.168	188.812
Italia	139.219.831	28.395.133	1.704.648	795.495	518.016	383.955	304.994

Prospetto 11 - Valori dei coefficienti a, b, c e di R² delle funzioni utilizzate per l'interpolazione degli errori campionari delle stime di totali per gruppi di stime e tipologie comunali - Stime del numero di viaggi - Anno 2009

TIPOLOGIE COMUNALI	Viaggi – lavoro			R ²
	a	b	c	
Comuni centro dell'area metropolitana	21.332,668	0,210534	-0,000000030649	94,9
Comuni periferia dell'area metropolitana	15.959,537	0,306182	-0,000000078275	94,4
Comuni con oltre 50.000 abitanti	11.471,282	0,274664	-0,000000055543	97,4
Comuni da 10.001 a 50.000 abitanti	16.556,792	0,263002	-0,000000040650	95,0
Comuni da 2.001 a 10.000 abitanti	19.256,117	0,225709	-0,000000040515	92,7
Comuni aventi fino a 2.000 abitanti	3.694,949	0,581343	-0,000000557430	88,0
TIPOLOGIE COMUNALI	Viaggi – vacanze			R ²
	a	b	c	
Comuni centro dell'area metropolitana	72.579,901	0,101191	-0,000000002566	90,4
Comuni periferia dell'area metropolitana	48.799,543	0,129198	-0,000000007481	87,4
Comuni con oltre 50.000 abitanti	51.547,327	0,097388	-0,000000003662	90,0
Comuni da 10.001 a 50.000 abitanti	51.191,409	0,091400	-0,000000003108	90,0
Comuni da 2.001 a 10.000 abitanti	51.420,985	0,104643	-0,000000004479	84,8
Comuni aventi fino a 2.000 abitanti	20.787,452	0,225195	-0,000000042401	87,4
TIPOLOGIE COMUNALI	Viaggi – totali			R ²
	a	b	c	
Comuni centro dell'area metropolitana	50.246,946	0,121724	-0,000000002728	85,3
Comuni periferia dell'area metropolitana	34.951,823	0,152104	-0,000000007077	85,8
Comuni con oltre 50.000 abitanti	34.049,979	0,119955	-0,000000003905	86,6
Comuni da 10.001 a 50.000 abitanti	34.893,741	0,112902	-0,000000003081	86,7
Comuni da 2.001 a 10.000 abitanti	33.720,740	0,129019	-0,000000004272	85,0
Comuni aventi fino a 2.000 abitanti	15.451,865	0,267904	-0,000000039409	88,2

Prospetto 12 - Valori dei totali corrispondenti ad alcuni valori tipici degli errori relativi percentuali per gruppi di stime e tipologie comunali - Stime del numero di viaggi – Anno 2009

TIPOLOGIE COMUNALI	Viaggi – lavoro						
	1%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Comuni centro dell'area metropolitana	6.647.644	5.367.513	3.790.104	2.280.317	1.023.653	409.994	221.619
Comuni periferia dell'area metropolitana	3.837.016	3.334.012	2.709.336	2.092.734	1.493.086	935.664	492.756
Comuni con oltre 50.000 abitanti	4.808.023	4.095.329	3.209.047	2.333.003	1.483.487	727.822	280.401
Comuni da 10.001 a 50.000 abitanti	6.288.699	5.316.529	4.109.025	2.919.401	1.778.839	817.861	328.756
Comuni da 2.001 a 10.000 abitanti	5.412.027	4.443.868	3.249.082	2.095.497	1.076.201	451.991	230.280
Comuni aventi fino a 2.000 abitanti	1.031.386	960.105	871.113	782.280	693.665	605.362	517.523
TIPOLOGIE COMUNALI	Viaggi – vacanze						
	1%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Comuni centro dell'area metropolitana	36.316.144	21.278.530	5.555.501	1.386.029	721.048	483.705	363.370
Comuni periferia dell'area metropolitana	16.332.027	11.169.973	5.165.497	1.517.591	645.244	394.332	282.219
Comuni con oltre 50.000 abitanti	24.441.452	13.950.609	3.412.197	920.752	493.654	335.072	253.254
Comuni da 10.001 a 50.000 abitanti	26.802.791	14.458.484	2.904.184	836.464	465.183	320.755	244.514
Comuni da 2.001 a 10.000 abitanti	21.659.038	13.076.863	3.945.818	1.029.099	526.237	349.981	261.645
Comuni aventi fino a 2.000 abitanti	5.170.091	4.247.313	3.110.285	2.016.553	1.057.718	466.322	244.111
TIPOLOGIE COMUNALI	Viaggi – totali						
	1%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Comuni centro dell'area metropolitana	41.396.878	26.973.021	9.835.554	1.546.336	628.171	388.501	280.645
Comuni periferia dell'area metropolitana	20.321.625	14.761.344	7.980.811	2.375.862	664.493	348.261	233.713
Comuni con oltre 50.000 abitanti	28.460.790	18.386.511	6.459.418	1.002.642	416.908	259.806	188.350
Comuni da 10.001 a 50.000 abitanti	33.735.108	20.956.777	6.057.304	876.737	395.102	253.077	185.930
Comuni da 2.001 a 10.000 abitanti	28.141.344	18.914.690	7.804.435	1.275.805	462.211	276.037	196.257
Comuni aventi fino a 2.000 abitanti	6.603.719	5.599.366	4.350.710	3.117.602	1.926.597	893.269	339.724

7. Esempi di calcolo degli errori campionari

7.1. Esempi di calcolo degli errori campionari per stime di totali riferiti ai viaggi e alle notti

Esempio 1

Come visto nel paragrafo precedente, il prospetto 7 presenta il valore dei coefficienti a, b e c delle funzioni utilizzate per l'interpolazione degli errori con riferimento alle stime del numero di notti, mentre il prospetto 9 presenta gli stessi coefficienti con riferimento alle stime del numero di viaggi.

Sulla base dei dati riportati in tali prospetti, è possibile calcolare l'errore di campionamento assoluto e relativo di una stima a livello trimestrale.

Se ad esempio si volesse calcolare l'errore di campionamento assoluto per una stima appartenente al gruppo del numero di notti per lavoro riferita al Centro per il terzo trimestre, ${}_C\hat{Y}_3$, si possono leggere i valori dei coefficienti a, b e c dal prospetto 7 e si può utilizzare la seguente espressione:

$$\hat{\sigma}({}_C\hat{Y}_3) = 28.116,19 + 0,680537{}_C\hat{Y}_3 - 0,0000000598({}_C\hat{Y}_3)^2$$

Esempio 2

La valutazione degli errori di campionamento delle stime mediante un metodo approssimato si può ottenere utilizzando i dati dei prospetti 8 e 10. Il prospetto 8 fa riferimento alle stime del numero di notti; il prospetto 10 fa riferimento alle stime del numero di viaggi. Tali prospetti sono articolati per trimestre e area territoriale e presentano gruppi di stime per valori prefissati degli errori di campionamento relativi pari all'1, 5, 10, 15, 20, 25 e 30%.

Considerando ad esempio il prospetto 8, si può osservare che il valore riportato all'incrocio tra la riga riferita alle notti per vacanza del terzo trimestre per l'Italia e la colonna relativa all'errore del 10% indica che tutte le stime superiori a 22.025.899 presentano un errore relativo inferiore al 10%; analogamente si avrà che le stime inferiori a tale valore presenteranno un errore relativo superiore al 10%.

Esempio 3

Per fare un ulteriore esempio e meglio specificare l'utilizzo del suddetto prospetto 8, si consideri la stima del numero di notti per lavoro, riferita al totale Italia nel trimestre luglio-settembre, pari a 21.266.000 (si veda il prospetto 1.1).

Dal prospetto 8, considerando le notti-lavoro ed esaminando l'ultima riga corrispondente al totale Italia per il trimestre luglio-settembre, si può osservare che il valore 21.266.000 risulta essere compreso tra i valori 25.499.735 e 20.592.392.

Da ciò si può facilmente desumere che il valore dell'errore relativo percentuale corrispondente è compreso tra il 10 ed il 15%.

7.2. Esempi di calcolo degli errori campionari per stime di frequenze riferite agli individui

Esempio 1

Dal prospetto 2.1, risulta che il totale delle persone che hanno viaggiato nel trimestre gennaio-marzo è pari a 11.173.000.

Si cerca il livello di stima che più si avvicina a 11.173.000 nella prima colonna del prospetto 5, che è pari a 10.000.000. Dalla colonna del prospetto, riferita all'Italia per il primo trimestre, si ricava il corrispondente errore relativo percentuale della stima considerata, che è pari a 2,4%.

L'errore assoluto sarà:

$$\sigma(11.173.000) = 2,4/100 \times 11.173.000 = 268.152$$

L'intervallo di confidenza avrà come estremi:

$$11.173.000 - (2 \times 268.152) = 10.636.696$$

$$11.173.000 + (2 \times 268.152) = 11.709.304$$

Esempio 2

Considerando la stima precedente, si possono ottenere valori più precisi dell'errore di campionamento mediante interpolazione lineare dei due livelli di stima consecutivi tra i quali è compreso il valore della stima considerato.

Tali livelli sono 10.000.000 e 15.000.000 ai quali corrispondono i valori 2,4 e 1,9 percentuali.

L'errore corrispondente a 11.173.000 è pari a:

$$\sigma(11.173.000) = 2,4 - ((2,4 - 1,9) / (15.000.000 - 10.000.000)) \times (11.173.000 - 10.000.000) = 1,28\%$$

Il corrispondente errore assoluto è $1,28/100 \times 11.173.000 = 143.014$ e l'intervallo di confidenza avrà come estremi:

$$11.173.000 - (2 \times 143.014) = 10.886.972$$

$$11.173.000 + (2 \times 143.014) = 11.459.028$$

Esempio 3

Il calcolo dell'errore può essere effettuato direttamente tramite la funzione interpolante (12):

$$\log \hat{\varepsilon}^2({}_d\hat{Y}_t) = a + b \log({}_d\hat{Y}_t)$$

Per la stima di 11.173.000 si ha:

$$\log \varepsilon^2 = 11,77505 - 1,20427 \times \log(11.173.000) = -7,76906.$$

Da questa il valore di ε è facilmente desumibile, calcolando la radice quadrata dell'antilogaritmo dell'espressione di sopra.

Infatti, da $\log(\varepsilon^2) = -7,76906$ si ha:

$$\varepsilon^2 = \exp(-7,76906)$$

e dunque:

$$\varepsilon = 0,021$$

L'errore relativo percentuale sarà dunque pari a 2,1%.