

FILE DATI

***Indagine Multiscopo sulle Famiglie
Aspetti della Vita quotidiana
Anno 2010***

Manuale utente e Tracciato record

**INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE
ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA ANNO 2010
DOCUMENTAZIONE TECNICA E DESCRIZIONE DEL FILE**

PREMESSA

Il decreto legislativo n.322 del 6/9/1989 regola la diffusione delle informazioni statistiche prodotte nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale al fine di garantire la riservatezza dei rispondenti. In particolare, per la diffusione di dati elementari, l'articolo 10, comma 2, dispone quanto segue: "Sono distribuite altresì ove disponibili, su richiesta motivata e previa autorizzazione del Presidente dell'Istat, collezioni campionarie di dati elementari, resi anonimi e privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con singole persone fisiche e giuridiche".

Nell'osservanza di tale disposizione e del d.lgs. del 30/6/2003 n. 196 ("codice in materia di protezione dei dati personali"), l'Istat ha adottato misure e tecniche che rendono impossibile, o altamente improbabile, il collegamento dei dati rilasciati con l'unità statistica a cui si riferiscono. Per tale motivo sono state apportate alcune modifiche sui files originali delle indagini, nell'intento di garantire la massima protezione ai dati contenendo al minimo l'eventuale perdita di informazioni.

Le metodologie applicate si concretizzano nell'accorpamento e/o riclassificazione di modalità di variabili e nell'oscuramento di variabili. In quest'ultimo caso nei campi del tracciato record è riportata la dicitura **"RISERVATO ISTAT"**.

Va considerato, inoltre, che la stessa dicitura è stata utilizzata anche per quelle variabili non attendibili dal punto di vista campionario e quindi non analizzabili statisticamente.

FINALITÀ E CARATTERISTICHE DELL'INDAGINE

A partire dal dicembre 1993 l'Istat ha avviato il nuovo corso delle Indagini Multiscopo sulle Famiglie. Ogni anno, alla fine dell'anno, vengono rilevati gli aspetti fondamentali della vita quotidiana e i comportamenti relativi all'anno in corso.

Aree tematiche variegata si susseguono nei questionari e permettono di cogliere come vive la popolazione, se è soddisfatta dei servizi di pubblica utilità che devono contribuire alla qualità della vita. I principali contenuti informativi dell'indagine sono: famiglia, abitazione, zona in cui si vive, istruzione e formazione, lavoro domestico ed extradomestico, spostamenti quotidiani, tempo libero e partecipazione sociale, stili di vita e condizioni di salute, consumo di farmaci e utilizzo dei servizi sanitari, funzionamento dei servizi di pubblica utilità.

L'indagine è stata condotta nel dicembre 1993 la prima volta, nel novembre 1994, nel dicembre 1995, nel novembre 1996, nel novembre 1997, nel novembre 1998, nel novembre del 1999, nel novembre del 2000, da dicembre 2001 a marzo 2002, nel novembre 2002, nell'ottobre 2003, nel marzo 2005, nel febbraio 2006, febbraio-marzo 2007, nel febbraio-marzo 2008, nel marzo 2009 e nel marzo 2010.

Il campione è a due stadi con stratificazione delle unità di primo stadio (Comuni). Ogni indagine ha raggiunto approssimativamente 20.000 famiglie per un totale di circa 50.000 individui. Le informazioni sono state raccolte con intervista diretta per una parte dei quesiti. Nei casi in cui l'individuo non fosse disponibile all'intervista per particolari motivi, le informazioni sono state fornite da un altro componente della famiglia. Per un'altra parte dei quesiti è stata prevista l'autocompilazione.

L'unità di rilevazione è costituita dalla famiglia di fatto (FF) associata alla famiglia anagrafica (FA) campionata. La famiglia di fatto è definita come quell'insieme di persone che :

1. hanno la loro dimora abituale nella stessa abitazione del capofamiglia anagrafico.

2. hanno con tale persona una relazione di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o affetto. Si noti come per l'individuazione di una FF siano più importanti i concetti di "abitazione" e "dimora abituale", che non l'effettiva registrazione anagrafica degli individui conviventi.

All'interno di ciascuna FF possono essere individuati nessuno, uno o più nuclei familiari. La definizione di nucleo familiare è più restrittiva di quella di famiglia. Infatti per un nucleo familiare si intende :

1. coppia, coniugata o convivente, con o senza figli mai sposati, né conviventi coniugalmente, né aventi figli propri;

2. un solo genitore con uno o più figli mai sposati, né conviventi coniugalmente, né aventi figli propri.

I componenti la famiglia di fatto che non soddisfano i precedenti requisiti, sono considerati come "membri isolati".

AVVERTENZE PER L'UTILIZZAZIONE DEL FILE

Per gli utenti esterni all'Istat vengono messi a disposizione dei files con le seguenti caratteristiche:

	Anno 2010
lunghezza record:	1.670
numero record individuali:	48.336
(uno per ciascuna persona intervistata)	

Ogni record contiene una prima parte di informazioni sull'individuo, una seconda parte sulla famiglia di appartenenza e una terza parte contenente alcune variabili create (cioè non rilevate direttamente). A seconda della selezione che si opera sul file è possibile effettuare elaborazioni sulle seguenti unità di analisi:

a) individui

ogni componente è individuato dal numero progressivo della famiglia e dal suo numero d'ordine all'interno della stessa. Il numero totale di appartenenti al campione è pari al numero di record: **48.336**. Per selezionare i componenti della stessa famiglia si considerano tutti i record individuali che hanno lo stesso numero generale progressivo della famiglia. Per selezionare i componenti appartenenti allo stesso nucleo si considerano tutti i record che hanno lo stesso numero progressivo della famiglia e lo stesso numero d'ordine del nucleo;

b) famiglie

volendo analizzare le famiglie occorre selezionare solo il primo componente di ciascuna utilizzando il numero d'ordine all'interno della famiglia. Il totale delle famiglie è pari a **19.720**;

c) nuclei familiari

l'analisi dei nuclei familiari è possibile, invece, selezionando la persona di riferimento di ciascun nucleo. Il totale dei nuclei è di **13.995**.

COSTRUZIONE DELLE STIME ED ERRORI DI CAMPIONAMENTO

Le informazioni riportate nei files sono di carattere campionario. Per ottenere stime relative all'intera popolazione oggetto d'indagine è necessario moltiplicare ciascuna informazione per il coefficiente di riporto all'universo.

Tali coefficienti sono stati determinati in modo da poter essere utilizzati indifferentemente per costruire sia stime relative alle persone sia stime riferite alle famiglie.

L'indagine ha la finalità di fornire stime riferite a :

1. l'intero territorio nazionale;
2. le cinque ripartizioni geografiche (Italia Nord-Occidentale, Italia Nord-Orientale, Italia Centrale, Italia Meridionale, Italia Insulare);
3. le regioni geografiche;
4. sei aree basate sulla tipologia socio-demografica dei comuni.

Per garantire la riservatezza e per limiti connessi alla numerosità campionaria non è possibile fornire contemporaneamente i dati su tutte e tre le suddivisioni territoriali suindicate. Sono disponibili, quindi, due files per ogni anno di indagine: uno contenente i codici di regione e ripartizione e l'altro con i codici di ripartizione ed area socio-demografica (dominio).

Nel diffondere i risultati di un'indagine campionaria occorre fornire agli utilizzatori le informazioni necessarie per valutare l'attendibilità delle stime ottenibili. Ad ogni stima corrisponde un errore campionario relativo; ciò significa che per consentire un uso corretto delle stime sarebbe necessario fornire per ogni stima il corrispondente errore campionario relativo. Questo, tuttavia, comporterebbe notevoli difficoltà per l'utilizzatore, dovute al fatto che la tutela della riservatezza impedisce di fornire i codici identificativi territoriali sui quali è basato il disegno dell'indagine. Per questo si ricorre ad una presentazione sintetica degli errori tramite il metodo dei modelli regressivi. Questo metodo si basa sulla determinazione di una funzione matematica che mette in relazione ciascuna stima con il proprio errore relativo.

Si riporta in allegato l'appendice dei volumi Istat della serie Multiscopo, contenente le informazioni relative al campionamento e al calcolo degli errori di stima da cui è possibile individuare gli esempi di calcolo degli errori campionari. In seguito sono accluse le tavole per il calcolo degli errori relativi ai dati contenuti nei files standard, per stime sugli individui e sulle famiglie.

Glossario

I dati generali individuali fanno riferimento alle caratteristiche delle persone all'epoca dell'intervista. In particolare:

- **l'età** è espressa in anni compiuti;
- **il titolo di studio** è quello più elevato conseguito;
- **la condizione** è quella dichiarata come unica o prevalente dalle persone di 15 anni e più.
Si precisa inoltre che per:

occupato si intende chi possiede un'occupazione in proprio o alle dipendenze da cui trae un profitto o una retribuzione (utile, onorario, stipendio, salario) o chi collabora con un familiare che svolge un'attività lavorativa in conto proprio senza avere un regolare contratto di lavoro (coadiuvante);

persona in cerca di occupazione si intende chi ha perduto una precedente occupazione alle dipendenze, o chi non ha mai esercitato un'attività lavorativa ed è alla ricerca attiva di un'occupazione che è in grado di accettare se gli viene offerta;

casalinga è chi si dedica prevalentemente alle faccende domestiche;

studente è chi si dedica prevalentemente allo studio;

ritirato dal lavoro è chi ha cessato un'attività lavorativa per raggiunti limiti di età, invalidità o altra causa; la figura del ritirato dal lavoro non coincide necessariamente con quella del pensionato in quanto, non sempre, il ritirato dal lavoro gode di una pensione;

in altra condizione è chi si trova in condizione diversa da quelle sopra elencate (militare, inabile al lavoro, benestante, detenuto, ecc.).

- **la posizione nella professione** è quella dichiarata come unica o prevalente dagli occupati di 15 anni e più che viene aggregata nel modo seguente:

dirigenti, imprenditori, liberi professionisti;

direttivi, quadri, impiegati;

capo operai, operai, subalterni (inclusi apprendisti, lavoratori a domicilio per conto di imprese);

lavoratori in proprio, coadiuvanti (inclusi soci di cooperative di produzione di beni e/o prestazioni di servizio).

- **le ripartizioni geografiche** costituiscono una suddivisione geografica del territorio e sono così articolate:

Italia nord-occidentale comprende: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria.

Italia nord-orientale comprende: Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna.

Italia centrale comprende: Toscana, Umbria, Marche, Lazio.

Italia meridionale comprende: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria.

Italia insulare comprende: Sicilia, Sardegna.

- **il tipo di comune**

I comuni italiani sono suddivisi nelle seguenti classi:

comuni centro delle aree metropolitane: si tratta dei comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania, Cagliari;

comuni appartenenti alla periferia delle aree metropolitane: costituiscono i comuni delle cinture urbane;

altri comuni: suddivisi per dimensione demografica (fino a 2.000 abitanti, da 2.001 a 10.000, da 10.001 a 50.000 e oltre i 50.000);

Si precisa che la soglia dei 2.000 abitanti costituisce la dimensione demografica suggerita dagli organismi internazionali per identificare uno stile di vita tipico dei piccoli centri.

- **famiglia e nucleo familiare**

Si precisa che:

la **famiglia** è costituita dall'insieme delle persone coabitanti legate da vincoli di matrimonio o parentela, affinità, adozione, tutela o affettivi;

il **nucleo** è l'insieme delle persone che formano una coppia con figli celibi o nubili, una coppia senza figli, un genitore solo con figli celibi o nubili;

Una famiglia può coincidere con un nucleo, può essere formata da un nucleo più altri membri aggregati, da più nuclei (con o senza membri aggregati), o da nessun nucleo (persone sole, famiglie composte ad esempio da due sorelle, da un genitore con figlio separato, divorziato o vedovo, ecc.).

- **Indice di massa corporea per le persone di 6-17 anni**

Per la definizione del sovrappeso e dell'obesità tra i bambini e ragazzi di 6-17 anni, si è fatto ricorso ai valori soglia elaborati da Cole, Bellizzi, Flegal, Dietz W. H. (2000)¹ ed adottati dall'International obesity Task force (IOTF)² (cfr. Prospetto n.1) .

Prospetto 1: Valori soglia IOTF relativi al sovrappeso e all'obesità per sesso e semestre di vita

ETA'	Valori soglia per il sovrappeso		Valori soglia per l'obesità	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
6,0	17,55	17,34	19,78	19,65
6,5	17,71	17,53	20,23	20,08
7,0	17,92	17,75	20,63	20,51
7,5	18,16	18,03	21,09	21,01
8,0	18,44	18,35	21,60	21,57
8,5	18,76	18,69	22,17	22,18
9,0	19,10	19,07	22,77	22,81
9,5	19,46	19,45	23,39	23,46
10,0	19,84	19,86	24,00	24,11
10,5	20,20	20,29	24,57	24,77
11,0	20,55	20,74	25,10	25,42
11,5	20,89	21,20	25,58	26,05
12,0	21,22	21,68	26,02	26,67
12,5	21,56	22,14	26,43	27,24
13,0	21,91	22,58	26,84	27,76
13,5	22,27	22,98	27,25	28,20
14,0	22,62	23,34	27,63	28,57
14,5	22,96	23,66	27,98	28,87
15,0	23,29	23,94	28,30	29,11
15,5	23,60	24,17	28,60	29,29
16,0	23,90	24,37	28,88	29,43
16,5	24,19	24,54	29,14	29,56
17,0	24,46	24,70	29,41	29,69
17,5	24,73	24,85	29,70	29,84
18,0	25,00	25,00	30,00	30,00

¹ Cole T., Bellizzi M. C., Flegal K. M., Dietz W. H., (2000) "Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: international survey". British Medical Journal; 320: 1-6.

² La popolazione di riferimento usata per il calcolo di tali cut-off point deriva dall'unione di dati derivanti da indagini campionarie di tipo cross-sectional rappresentative a livello nazionale svolte nei seguenti sei paesi: Brasile, Gran Bretagna, Hong Kong, Paesi Bassi, Singapore e Stati Uniti d'America. L'individuazione dei valori soglia corrispondenti al sovrappeso e all'obesità è stata fatta trasferendo i due percentili corrispondenti ai valori soglia definiti per gli adulti (25 kg/m² per il sovrappeso e 30 kg/m² per l'obesità) alle distribuzioni dell'indice di massa corporea (IMC) relative ai soggetti con meno di 18 anni, ottenendo valori soglia specifici per genere e semestre di vita.

Strategia di campionamento e livello di precisione dei risultati

1. Obiettivi conoscitivi

La popolazione di interesse dell'indagine multiscopo "Aspetti della vita quotidiana", ossia l'insieme delle unità statistiche intorno alle quali si intende investigare, è costituita dalle famiglie residenti in Italia e dai membri che le compongono; sono pertanto esclusi i membri permanenti delle convivenze. La famiglia è intesa come *famiglia di fatto*, ossia un insieme di persone coabitanti e legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o affettivi.

Il periodo di riferimento è prevalentemente costituito dai dodici mesi che precedono l'intervista, anche se per alcuni quesiti il riferimento è al momento dell'intervista.

I domini di studio, ossia gli ambiti rispetto ai quali sono riferiti i parametri di popolazione oggetto di stima, sono:

- l'intero territorio nazionale;
- le cinque ripartizioni geografiche (Italia nord-occidentale, Italia nord-orientale, Italia centrale, Italia meridionale, Italia insulare);
- le regioni geografiche (a eccezione del Trentino-Alto Adige le cui stime sono prodotte separatamente per le province di Bolzano e Trento);
- la tipologia comunale ottenuta suddividendo i comuni italiani in sei classi formate in base a caratteristiche socio-economiche e demografiche:

A) comuni appartenenti all'area metropolitana suddivisi in:

- A₁, comuni centro dell'area metropolitana: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania, Cagliari;
- A₂, comuni che gravitano intorno ai comuni centro dell'area metropolitana;

B) comuni non appartenenti all'area metropolitana suddivisi in:

- B₁ comuni aventi fino a 2.000 abitanti;
- B₂ comuni con 2.001-10.000 abitanti;
- B₃ comuni con 10.001-50.000 abitanti;
- B₄ comuni con oltre 50.000 abitanti.

2. Strategia di campionamento

2.1 Descrizione generale del disegno di campionamento

Il disegno di campionamento è di tipo complesso e si avvale di due differenti schemi di campionamento. Nell'ambito di ognuno dei domini definiti dall'incrocio della regione geografica con le sei aree A₁, A₂, B₁, B₂, B₃ e B₄, i comuni sono suddivisi in due sottoinsiemi sulla base della popolazione residente:

- l'insieme dei comuni Auto rappresentativi (che indicheremo d'ora in avanti come comuni Ar) costituito dai comuni di maggiore dimensione demografica;
- l'insieme dei comuni Non auto rappresentativi (o Nar) costituito dai rimanenti comuni.

Nell'ambito dell'insieme dei comuni Ar, ciascun comune viene considerato come uno strato a se stante e viene adottato un disegno noto con il nome di campionamento a grappoli. Le unità primarie di campionamento sono rappresentate dalle famiglie anagrafiche, estratte in modo sistematico dall'anagrafe del comune stesso;

per ogni famiglia anagrafica inclusa nel campione vengono rilevate le caratteristiche oggetto di indagine di tutti i componenti di fatto appartenenti alla famiglia medesima.

Nell'ambito dei comuni Nar viene adottato un disegno a due stadi con stratificazione delle unità primarie. Le Unità primarie (Up) sono i comuni, le Unità secondarie sono le famiglie anagrafiche; per ogni famiglia anagrafica inclusa nel campione vengono rilevate le caratteristiche oggetto di indagine di tutti i componenti di fatto appartenenti alla famiglia medesima.

I comuni vengono selezionati con probabilità proporzionali alla loro dimensione demografica e senza reimmissione, mentre le famiglie vengono estratte con probabilità uguali e senza reimmissione.

2.2 Definizione della dimensione campionaria

Per un'indagine ad obiettivi plurimi, come quella in esame, è poco realistico pensare di poter disegnare una strategia campionaria che assicuri prefissati livelli di precisione di tutte le stime prodotte. La questione è complicata dal fatto che l'indagine ha la finalità di determinare stime per livelli territoriali differenti, il che comporta l'adozione di soluzioni di tipo ottimale diverse e contrastanti. Ad esempio, se l'unico ambito territoriale di pubblicazione delle stime fosse quello nazionale, una soluzione approssimativamente ottimale sarebbe quella di determinare la numerosità nazionale e ripartirla tra le regioni in modo proporzionale alla loro dimensione demografica; viceversa, avendo la finalità di produrre stime con uguale attendibilità a livello regionale, una soluzione approssimativamente ottimale sarebbe quella di selezionare un campione uguale in tutte le regioni. Quest'ultima soluzione, però, è poco efficiente per le stime a livello nazionale. Per affrontare questo problema, conformemente a quanto fatto in altri paesi, si è fatto ricorso ad una strategia che perviene alla definizione della numerosità campionaria attraverso approssimazioni successive.

In base alle considerazioni precedenti si è deciso di adottare un'ottica mista basata sia su criteri di costo ed organizzativi, sia su una valutazione degli errori campionari delle principali stime a livello nazionale e con riferimento a ciascuno dei domini territoriali di interesse.

I criteri seguiti possono essere sintetizzati nei seguenti punti:

- la dimensione del campione teorico in termini di famiglie, prefissata a livello nazionale essenzialmente in base a criteri di costo ed operativi, è pari a circa 24.000 famiglie;
- il numero di comuni campione interessati non deve essere superiore a 900 in modo da consentire un buon lavoro di controllo e supervisione.

L'allocazione del campione di famiglie e di comuni tra le varie regioni è stata quindi calcolata adottando un criterio di compromesso tale da garantire sia l'affidabilità delle stime a livello nazionale che quella delle stime a livello di ciascuno dei domini territoriali descritti nel paragrafo 1.

2.3 Stratificazione e selezione delle unità campionarie

L'obiettivo della stratificazione è quello di formare gruppi (o strati) di unità caratterizzate, relativamente alle variabili oggetto d'indagine, da massima omogeneità interna agli strati e massima eterogeneità fra gli strati. Il raggiungimento di tale obiettivo si traduce in termini statistici in un guadagno nella precisione delle stime, ossia in una riduzione dell'errore campionario a parità di numerosità campionaria.

Nell'indagine in esame, i comuni vengono stratificati in base alla loro dimensione demografica e nel rispetto delle seguenti condizioni:

- autoponderazione del campione a livello regionale;
- selezione di un comune campione nell'ambito di ciascuno strato definito sui comuni dell'insieme Nar;
- scelta di un numero minimo di famiglie da intervistare in ciascun comune campione; tale numero è stato posto pari a 23;
- formazione di strati aventi ampiezza approssimativamente costante in termini di popolazione residente.

Il procedimento di stratificazione, attuato all'interno di ogni dominio territoriale individuato dalle aree A_1 , A_2 , B_1 , B_2 , B_3 e B_4 di ciascuna regione geografica, si articola nelle seguenti fasi:

- ordinamento dei comuni del dominio in ordine decrescente secondo la loro dimensione demografica in termini di popolazione residente;
- determinazione di una soglia di popolazione per la definizione dei comuni A_r , mediante la relazione:

$${}_r\lambda = \frac{{}_r\bar{m} \cdot {}_r\delta}{{}_rf}$$

in cui per la generica regione geografica r si è indicato con: ${}_r\bar{m}$ il numero minimo di famiglie da intervistare in ciascun comune campione; ${}_r\delta$ il numero medio di componenti per famiglia; ${}_rf$ la frazione di campionamento;

- suddivisione di tutti i comuni nei due sottoinsiemi A_r e Nar : i comuni di dimensione superiore o uguale a ${}_r\lambda$ sono definiti come comuni A_r e i rimanenti come Nar ;
- suddivisione dei comuni dell'insieme Nar in strati aventi dimensione, in termini di popolazione residente, approssimativamente costante e all'incirca pari alla soglia ${}_r\lambda$.

Effettuata la stratificazione, i comuni A_r sono inclusi con certezza nel campione; per quanto riguarda, invece, i comuni Nar , nell'ambito di ogni strato viene estratto un comune campione con probabilità proporzionale alla dimensione demografica, mediante la procedura di selezione sistematica proposta da Madow.³

La selezione delle famiglie da intervistare in ogni comune campione viene effettuata dalla lista anagrafica di ciascun comune senza reimmissione e con probabilità uguali.

In particolare, la tecnica di selezione è di tipo sistematico e, nell'ambito di ogni comune viene attuata attraverso le seguenti fasi:

- vengono messi in sequenza i fogli delle famiglie dell'anagrafe del comune;
- si calcola il passo di campionamento e_{hi} , come rapporto tra il numero delle famiglie residenti nel comune i dello strato h e il corrispondente numero di famiglie campione, $e_{hi} = M_{hi}/m_{hi}$;
- si selezionano le m_{hi} famiglie che nella sequenza costruita al punto 1) occupano le seguenti posizioni :

$$1, 1+e_{hi}, 1+2e_{hi}, \dots, 1+(m_{hi}-1)e_{hi}.$$

Nel prospetto 1 viene riportata la distribuzione regionale dell'universo e del campione dei comuni, delle famiglie e degli individui.

³ Madow, W.G. "On the theory of systematic sampling II", *Annals of Mathematical Statistics*, 20, (1949): 333-354.

Prospetto 1 – Distribuzione regionale dei comuni, delle famiglie e degli individui nell'universo e nel campione – Anno 2010

REGIONI	Comuni		Famiglie		Individui	
	Campione	Universo	Campione	Universo (a)	Campione	Universo (a)
Piemonte / Valle d'Aosta - Vallée d'Aoste	84	1.280	1.907	2.030	4.219	4.531
Lombardia	80	1.546	1.694	4.073	4.088	9.758
Trentino-Alto Adige	48	339	1.154	421	2.754	1.017
Veneto	54	581	1.129	1.963	2.797	4.866
Friuli-Venezia Giulia	32	219	749	540	1.735	1.220
Liguria	26	235	882	754	1.896	1.602
Emilia-Romagna	47	341	1.088	1.887	2.496	4.345
Toscana	49	287	1.066	1.557	2.543	3.705
Umbria	22	92	587	361	1.479	895
Marche	37	246	821	626	2.067	1.568
Lazio	34	378	1.171	2.387	2.754	5.637
Abruzzo	34	305	749	534	1.928	1.332
Molise	24	136	582	127	1.442	319
Campania	55	551	1.424	2.069	3.976	5.806
Puglia	50	258	1.101	1.527	2.875	4.069
Basilicata	25	131	577	233	1.486	587
Calabria	42	409	948	767	2.483	2.000
Sicilia	52	390	1.296	1.951	3.314	5.021
Sardegna	39	377	795	658	2.004	1.664
Italia	834	8.101	19.720	24.465	48.336	59.939

(a) Stima Indagine multiscopo "Aspetti della vita quotidiana", dati in migliaia.

2.4 Procedimento per il calcolo delle stime

Le stime prodotte dall'indagine sono essenzialmente stime di frequenze assolute e relative, riferite alle famiglie e agli individui.

Le stime sono ottenute mediante uno stimatore di ponderazione vincolata, che è il metodo di stima adottato per la maggior parte delle indagini Istat sulle imprese e sulle famiglie.

Il principio su cui è basato ogni metodo di stima campionaria è che le unità appartenenti al campione rappresentino anche le unità della popolazione che non sono incluse nel campione.

Questo principio viene realizzato attribuendo a ogni unità campionaria un peso che indica il numero di unità della popolazione rappresentata dall'unità medesima. Se, per esempio, a un'unità campionaria viene attribuito un peso pari a 30, allora questa unità rappresenta se stessa e altre 29 unità della popolazione che non sono state incluse nel campione.

Al fine di rendere più chiara la successiva esposizione, introduciamo la seguente simbologia: d , indice di livello territoriale di riferimento delle stime; i , indice di comune; j , indice di famiglia; p , indice di componente della famiglia; h , indice di strato di comuni; y , generica variabile oggetto di indagine; Y_{hijp} , valore di y osservato sul componente p della famiglia j del comune i dello strato h ; P_{hij} , numero di componenti della

famiglia j del comune i dello strato h ; $Y_{hij} = \sum_{p=1}^{P_{hij}} Y_{hijp}$, totale della variabile y osservato sulla famiglia j del

comune i dello strato h ; M_{hi} , numero di famiglie residenti nel comune i dello strato h ; m_{hi} , campione di famiglie nel comune i dello strato h ; N_h , totale di comuni nello strato h ; n_h , numero di comuni campione nello strato h (nell'indagine in oggetto si ha $n_h = 1$); H_d , numero totale di strati nel generico dominio territoriale d .

Ipotizziamo di voler stimare, con riferimento ad un generico dominio d , il totale della generica variabile y oggetto di indagine, espresso dalla seguente relazione

$$Y_d = \sum_{h=1}^{H_d} \sum_{i=1}^{N_h} \sum_{j=1}^{M_{hi}} Y_{hij} \quad (1)$$

La stima del totale (1) è data da

$$\hat{Y}_d = \sum_{h=1}^{H_d} \hat{Y}_h, \quad \text{essendo} \quad \hat{Y}_h = \sum_{i=1}^{n_h} \sum_{j=1}^{m_{hi}} W_{hij} Y_{hij}, \quad (2)$$

in cui W_{hij} è il peso finale da attribuire a tutti i componenti della famiglia j del comune i dello strato h .

Dalla precedente relazione si desume, quindi, che per ottenere la stima del totale (1) occorre moltiplicare il valore della variabile y assunto da ciascuna unità campionaria per il peso di tale unità⁴ ed effettuare, a livello del dominio di interesse, la somma dei prodotti così ottenuti.

Il peso da attribuire alle unità campionarie è ottenuto per mezzo di una procedura complessa che:

- corregge l'effetto distorsivo della mancata risposta totale dovuta all'impossibilità di intervistare alcune delle famiglie selezionate per irreperibilità o per rifiuto all'intervista;
- tiene conto della conoscenza di totali noti di importanti variabili ausiliarie (disponibili da fonti esterne all'indagine), nel senso che le stime campionarie dei totali noti delle variabili ausiliarie devono coincidere con i valori noti degli stessi.

Nell'indagine in oggetto vengono definiti per ciascuna regione geografica 18 totali noti, che si riferiscono alla distribuzione della popolazione regionale per sesso e sei classi di età⁵ e della popolazione regionale nelle sei aree A_1, A_2, B_1, B_2, B_3 e B_4 . Indicando, quindi, con ${}_kX$ ($k=1, \dots, 18$) il totale noto della k -esima variabile ausiliaria per la generica regione geografica e con ${}_kX_{hij}$ il valore assunto dalla k -esima variabile ausiliaria per la famiglia rispondente hij , la condizione sopra descritta è espressa dalla seguente uguaglianza

$${}_kX = \sum_{h=1}^H \sum_{i=1}^{n_h} \sum_{j=1}^{m_{hi}} W_{hijk} X_{hij} \quad (k=1, \dots, 18)$$

in cui H indica il numero complessivo di strati definiti nella regione. Se, ad esempio, ${}_6X$ indica il numero di maschi di età maggiore o uguale a sessantacinque anni, la variabile ausiliaria ${}_6X_{hij}$ rappresenta il numero di maschi di età maggiore o uguale a sessantacinque anni della famiglia hij .

La procedura che consente di costruire i *pesi finali* da attribuire alle unità campionarie rispondenti, è articolata nelle seguenti fasi:

- 1) si calcolano i *pesi diretti* come reciproco della probabilità di inclusione delle unità;
- 2) si calcolano i fattori correttivi per mancata risposta totale, come l'inverso del tasso di risposta del comune cui ciascuna unità appartiene;
- 3) si ottengono i *pesi base*, o pesi corretti per mancata risposta totale, moltiplicando i pesi diretti per i corrispondenti fattori correttivi per mancata risposta totale;
- 4) si costruiscono i fattori correttivi che consentono di soddisfare, a livello regionale, la condizione di uguaglianza tra i totali noti delle variabili ausiliarie e le corrispondenti stime campionarie;
- 5) si calcolano, infine, i pesi finali mediante il prodotto dei pesi base per i fattori correttivi ottenuti al passo 4.

I fattori correttivi del passo 4 sono ottenuti dalla risoluzione di un problema di minimo vincolato, in cui la funzione da minimizzare è una funzione di distanza (opportunamente prescelta) tra i pesi base e i pesi finali e i vincoli sono definiti dalla condizione di uguaglianza tra stime campionarie dei totali noti di popolazione e

⁴ Al fine di ottenere stime coerenti per individui e famiglie i pesi finali sono definiti in modo tale che a ciascuna famiglia hij e a tutti i componenti della stessa sia assegnato un medesimo peso finale W_{hij} .

⁵ Le classi di età considerate sono: 0-5 anni, 6-13 anni, 14-24 anni, 25-44 anni, 45-64 anni, 65 anni e più.

valori noti degli stessi. La funzione di distanza prescelta è la funzione logaritmica troncata; l'adozione di tale funzione garantisce che i pesi finali siano positivi e contenuti in un predeterminato intervallo di valori possibili, eliminando in tal modo i pesi positivi estremi (troppo grandi o troppo piccoli).

Tutti i metodi di stima che scaturiscono dalla risoluzione di un problema di minimo vincolato del tipo sopra descritto rientrano in una classe generale di stimatori nota come stimatori di ponderazione vincolata.⁶ Un importante stimatore appartenente a tale classe, che si ottiene utilizzando la funzione di distanza euclidea, è lo *stimatore di regressione generalizzata*. Come verrà chiarito meglio nel paragrafo 3, tale stimatore riveste un ruolo centrale perché è possibile dimostrare che tutti gli stimatori di ponderazione vincolata convergono asintoticamente, all'aumentare della numerosità campionaria, allo stimatore di regressione generalizzata.

3. Valutazione del livello di precisione delle stime

3.1 Metodologia di calcolo degli errori campionari

Le principali statistiche di interesse per valutare la variabilità campionaria delle stime prodotte da un'indagine sono l'errore di campionamento assoluto e l'errore di campionamento relativo. Indicando con $\hat{\text{Var}}(\hat{Y}_d)$ la stima della varianza della generica stima \hat{Y}_d , la stima dell'errore di campionamento assoluto di \hat{Y}_d si può ottenere mediante la seguente espressione:

$$\hat{\sigma}(\hat{Y}_d) = \sqrt{\hat{\text{Var}}(\hat{Y}_d)} ; \quad (3)$$

la stima dell'errore di campionamento relativo di \hat{Y}_d è invece definita dall'espressione:

$$\hat{\varepsilon}(\hat{Y}_d) = \frac{\hat{\sigma}(\hat{Y}_d)}{\hat{Y}_d} . \quad (4)$$

Come è stato descritto nel paragrafo 2.4, le stime prodotte dall'indagine sono state ottenute mediante uno stimatore di ponderazione vincolata definito in base a una funzione di distanza di tipo logaritmico troncato. Poiché, lo stimatore adottato non è funzione lineare dei dati campionari, per la stima della varianza $\hat{\text{Var}}(\hat{Y}_d)$ si è utilizzato il metodo proposto da Woodruff; in base a tale metodo, che ricorre all'espressione linearizzata in serie di Taylor, è possibile ricavare la varianza di ogni stimatore non lineare (funzione regolare di totali) calcolando la varianza dell'espressione linearizzata ottenuta. In particolare, per la definizione dell'espressione linearizzata dello stimatore ci si è riferiti allo stimatore di regressione generalizzata, sfruttando la convergenza asintotica di tutti gli stimatori di ponderazione vincolata a tale stimatore, poiché nel caso di stimatori di ponderazione vincolata che utilizzano funzioni distanza differenti dalla distanza euclidea (che conduce allo stimatore di regressione generalizzata) non è possibile derivare l'espressione linearizzata dello stimatore.

L'espressione linearizzata dello stimatore (2) è data, quindi, da:

$$\hat{Y}_d \cong \hat{Z}_d = \sum_{h=1}^{H_d} \hat{Z}_h , \quad \text{essendo} \quad \hat{Z}_h = \sum_{i=1}^{n_h} \sum_{j=1}^{m_{hj}} Z_{hij} W_{hij} \quad (5)$$

dove Z_{hij} è la variabile linearizzata espressa come $Z_{hij} = Y_{hij} - \mathbf{X}'_{hij}\beta$, essendo $\mathbf{X}_{hij} = (X_{hij1}, \dots, X_{hijK})'$ il vettore contenente i valori delle K (K=18) variabili ausiliarie, osservati per la generica famiglia hij e $\hat{\beta}$, il vettore dei coefficienti di regressione del modello lineare che lega la variabile di interesse y alle K variabili

⁶ Nella letteratura in lingua anglosassone sull'argomento tali stimatori sono noti come *calibration estimators*.

ausiliarie x. In base alla (5), si ha, quindi, che la stima della varianza della stima \hat{Y}_d è ottenuta mediante la seguente relazione

$$\hat{\text{Var}}(\hat{Y}_d) \equiv \hat{\text{Var}}(\hat{Z}_d) = \sum_{h=1}^{H_d} \hat{\text{Var}}(\hat{Z}_h). \quad (6)$$

Dalla (6) risulta che la stima della varianza della stima \hat{Y}_d viene calcolata come somma della stima delle varianze dei singoli strati, Ar e Nar, appartenenti al dominio d. La formula di calcolo della varianza, $\hat{\text{Var}}(\hat{Z}_h)$, della stima \hat{Z}_h è differente a seconda che lo strato sia Ar oppure Nar. Possiamo, quindi scomporre come segue

$$\hat{\text{Var}}(\hat{Y}_d) \equiv \hat{\text{Var}}(\hat{Z}_d) = \sum_{h=1}^{H_{AR}} \hat{\text{Var}}(\hat{Z}_h) + \sum_{h=1}^{H_{NAR}} \hat{\text{Var}}(\hat{Z}_h), \quad (7)$$

in cui H_{AR} e H_{NAR} indicano rispettivamente il numero di strati Ar e Nar appartenenti al dominio d.

Negli strati Ar (in cui ciascun comune fa strato a sé e $N_h = n_h = 1$, l'indice i di comune diviene superfluo e viene omissso) la varianza è stimata mediante la seguente espressione:

$$\sum_{h=1}^{H_{AR}} \hat{\text{Var}}(\hat{Z}_h) = \sum_{h=1}^{H_{AR}} M_h^2 \frac{(M_h - m_h)}{m_h(m_h - 1)} \sum_{j=1}^{m_h} (Z_{hj} - \bar{Z}_h)^2, \quad (8)$$

dove si è posto $M_h = M_{hi}$, $m_h = m_{hi}$, $Z_{hj} = Z_{hij}$ e $\bar{Z}_h = \frac{1}{m_h} \sum_{j=1}^{m_h} Z_{hj}$.

Negli strati Nar, in cui viene estratto un solo comune campione da ogni strato, per stimare la varianza di campionamento si ricorre alla *tecnica di collassamento degli strati*. Questa tecnica consiste nel formare G gruppi contenenti ciascuno L_g ($L_g \geq 2$) strati; la varianza viene stimata mediante la formula seguente:

$$\sum_{h=1}^{H_{NAR}} \hat{\text{Var}}(\hat{Z}_h) = \sum_{g=1}^G \hat{\text{Var}}(\hat{Z}_g) = \sum_{g=1}^G \frac{L_g}{L_g - 1} \sum_{h=1}^{L_g} \left(\hat{Z}_{hg} - \frac{\hat{Z}_g}{L_g} \right)^2 \quad (9)$$

dove le quantità sono espresse come:

$$\hat{Z}_{hg} = \sum_{j=1}^{m_{hi}} Z_{hij} W_{hij} \quad \text{e} \quad \hat{Z}_g = \sum_{h=1}^{L_g} \sum_{j=1}^{m_{hi}} Z_{hij} W_{hij}.$$

Utilizzando le espressioni (8) e (9) è possibile, infine, calcolare la varianza di campionamento, $\hat{\text{Var}}(\hat{Y}_d)$, in base alla (7) e calcolare, quindi, in base alla (3) ed alla (4) rispettivamente l'errore di campionamento assoluto e l'errore di campionamento relativo.

Gli errori campionari espressi dalla (3) e dalla (4) consentono di valutare il grado di precisione delle stime; inoltre, l'errore assoluto permette di costruire un intervallo di confidenza, che, con livello di fiducia P contiene il parametro oggetto di stima, l'intervallo viene espresso come:

$$\{\hat{Y}_d - k_p \hat{\sigma}(\hat{Y}_d) \leq Y_d \leq \hat{Y}_d + k_p \hat{\sigma}(\hat{Y}_d)\} \quad (10)$$

Nella (10) il valore di k_p dipende dal valore fissato per la probabilità P; ad esempio, per $P=0.95$ si ha $k=1.96$.

3.2 Fondamenti statistici della procedura per il calcolo degli errori campionari

Per il calcolo degli errori di campionamento delle indagini condotte dall'Istat sulle famiglie e sulle imprese viene correntemente utilizzata una procedura informatica sviluppata nell'ambito dell'Istituto. Nel paragrafo 3.1 è stata descritta la metodologia, implementata dalla procedura, per il calcolo degli errori di campionamento delle stime prodotte dall'indagine mentre, nel presente paragrafo, vengono discussi i fondamenti statistici e i limiti della metodologia medesima.

Negli strati Ar, nei quali si adotta un disegno di campionamento a grappoli e in cui le unità primarie (le famiglie) vengono selezionate senza reimmissione e probabilità uguali, la procedura consente di ottenere stime della varianza campionaria che risultano corrette.

Negli strati Nar, per i quali si adotta un disegno di campionamento a due stadi con selezione delle unità primarie (comuni) senza reimmissione e probabilità variabili, la procedura consente di ottenere stime corrette della varianza campionaria qualora:

- in ciascuno strato sono selezionate due o più unità primarie;
- le unità primarie sono scelte mediante estrazioni indipendenti.

La prima condizione non viene soddisfatta in quanto, nell'indagine in oggetto, da ciascuno strato viene selezionato un solo comune campione e per stimare la varianza di campionamento si ricorre alla tecnica di *collassamento degli strati*. Questa tecnica, che consiste nel formare superstrati contenenti ciascuno un numero di strati maggiore di uno, conduce in generale ad una sovrastima della varianza di campionamento effettiva.

La seconda ipotesi implica che la selezione delle unità primarie venga effettuata con reimmissione. Anche questa assunzione non è soddisfatta per i comuni Nar e ciò comporta una sovrastima della varianza. Si osservi, tuttavia, che tale sovrastima dipende dalla frazione di campionamento di ciascuno strato Nar: è di entità trascurabile negli strati nei quali la frazione di campionamento è piccola, mentre viceversa può risultare di entità più cospicua per quegli strati in cui la frazione di campionamento è maggiore.

3.3 Presentazione sintetica degli errori campionari

Ad ogni stima \hat{Y}_d corrisponde un errore di campionamento relativo $\hat{\varepsilon}(\hat{Y}_d)$; ciò significa che per consentire una lettura corretta delle tabelle pubblicate sarebbe necessario presentare per ogni stima pubblicata il corrispondente errore di campionamento relativo. Ciò, tuttavia, non è possibile sia per limiti di tempo e di costi di elaborazione, sia perché le tavole della pubblicazione risulterebbero appesantite e di non facile consultazione per l'utente finale. Inoltre, non sarebbero comunque disponibili gli errori delle stime non pubblicate, che l'utente può ricavare in modo autonomo.

Per le ragioni sopra esposte, si ricorre frequentemente a una presentazione sintetica degli errori relativi, basata sul *metodo dei modelli regressivi*. Questo metodo si basa sulla determinazione di una funzione matematica che mette in relazione ciascuna stima con il proprio errore relativo.

Nella presente indagine, il modello utilizzato per le stime di frequenze assolute e relative, è del tipo seguente:

$$\log(\hat{\varepsilon}^2(\hat{Y}_d)) = a + b \log(\hat{Y}_d) \quad (11)$$

dove i parametri a e b vengono stimati utilizzando il metodo dei minimi quadrati.

Nel prospetto 2 sono riportati i valori dei coefficienti a e b e dell'indice di determinazione R^2 del modello utilizzato per l'interpolazione degli errori campionari di stime di frequenze assolute e relative, per totale Italia, ripartizione geografica, tipologia comunale e regione.

Sulla base delle informazioni contenute in tale prospetto, è possibile calcolare la stima dell'errore di campionamento relativo di una determinata stima di frequenza assoluta \hat{Y}_d mediante la formula:

$$\hat{\varepsilon}(\hat{Y}_d) = \sqrt{\exp(a + b \log(\hat{Y}_d))} \quad (12)$$

che si ricava facilmente dalla (11).

Se, per esempio, la stima \hat{Y}_d si riferisce agli individui dell'Italia Nord occidentale, l'errore relativo corrispondente si ottiene introducendo nella (12) i valori dei parametri a e b riportati nella seconda riga del prospetto 2 alla voce Persone (a = 8,886722, b = -1,121521).

I prospetti 3 e 4, presentati in aggiunta, consentono di rendere più agevole il calcolo degli errori campionari. Essi riguardano, rispettivamente, le famiglie e gli individui e hanno la seguente struttura: a) in fiancata sono elencati i valori crescenti di stima (20.000, 30.000, ..., 25.000.000); b) le colonne successive contengono gli errori di campionamento relativo, per ciascun dominio territoriale di interesse, calcolati mediante la formula (12), corrispondenti alle stime di frequenze assolute della prima colonna.

Le informazioni contenute in tali prospetti permettono di calcolare l'errore relativo di una generica stima di frequenza assoluta (o relativa) mediante due procedimenti che risultano di facile applicazione, anche se conducono a risultati meno precisi di quelli ottenibili mediante l'espressione (12). Il primo metodo consiste nell'individuare, nella prima colonna del prospetto, il livello di stima che più si avvicina alla stima di interesse e nel considerare come errore relativo il valore che si trova sulla stessa riga, nella colonna corrispondente al dominio territoriale di riferimento.

Con il secondo metodo, l'errore campionario della stima \hat{Y}_d si ricava mediante la seguente espressione:

$$\hat{\varepsilon}(\hat{Y}_d) = \hat{\varepsilon}(\hat{Y}_d^{k-1}) - \frac{\hat{\varepsilon}(\hat{Y}_d^{k-1}) - \hat{\varepsilon}(\hat{Y}_d^k)}{\hat{Y}_d^k - \hat{Y}_d^{k-1}} (\hat{Y}_d - \hat{Y}_d^{k-1}) \quad (13)$$

dove \hat{Y}_d^{k-1} e \hat{Y}_d^k sono i valori delle stime, riportati nella prima colonna, entro i quali è compresa la stima di interesse \hat{Y}_d , ed $\hat{\varepsilon}(\hat{Y}_d^{k-1})$ e $\hat{\varepsilon}(\hat{Y}_d^k)$ i corrispondenti errori relativi.

Prospetto 2 – Valori dei coefficienti a, b e dell'indice di determinazione R² (%) delle funzioni utilizzate per le interpolazioni degli errori campionari delle stime riferite alle famiglie e alle persone per totale Italia, ripartizione geografica, tipo di comune e regione – Anno 2010

ZONE TERRITORIALI	Famiglie			Persone		
	a	b	R ² (%)	a	b	R ² (%)
ITALIA	9,79046754	-1,184168267	94,98	8,370753437	-1,073000042	96,12
RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE						
Nord	9,919649931	-1,192335627	93,54	8,626373011	-1,086119259	94,57
Nord-ovest	9,554363336	-1,162006188	92,52	8,929012629	-1,102759197	92,51
Nord-est	8,553720381	-1,121667789	96,96	8,520059446	-1,106957328	95,55
Centro	9,171848867	-1,167896279	97,41	10,01791423	-1,221085535	95,66
Mezzogiorno	9,028256814	-1,161779526	95,17	8,219184691	-1,079284084	94,55
Sud	8,672553852	-1,138439115	94,28	8,285416588	-1,086612617	92,53
Isole	9,085111618	-1,187747198	96,16	8,291041207	-1,096871498	95,38
TIPI DI COMUNE						
A1	9,365573856	-1,177007242	97,66	9,969577321	-1,217625011	96,57
A2	9,367191413	-1,159342043	87,30	7,850649447	-1,019443433	88,01
B1	6,935255674	-1,008687922	86,20	6,990953397	-1,01706845	91,39
B2	8,566485926	-1,110992153	93,02	7,963891679	-1,047688348	92,99
B3	8,711707251	-1,134453926	96,99	8,356248078	-1,089044735	95,44
B4	9,079477828	-1,178251493	97,61	9,57492063	-1,207966527	96,57
REGIONI						
Piemonte - Valle d'Aosta - Vallée d'Aoste	7,75239048	-1,06722526	94,65	7,72266789	-1,06072880	90,44
Lombardia	9,709148335	-1,160420667	92,46	8,822902433	-1,079413717	91,75
Trentino-Alto Adige	7,38981197	-1,178052995	97,00	8,265411882	-1,291210967	80,02
Veneto	8,746842324	-1,133683364	95,97	8,690069404	-1,116305036	94,28
Friuli-Venezia Giulia	8,381515723	-1,205558679	96,87	7,826722191	-1,143722514	94,98
Liguria	8,352002356	-1,182304177	96,79	8,282825137	-1,165383174	95,75
Emilia-Romagna	8,814952815	-1,14611923	97,46	8,666657874	-1,118144374	95,69
Toscana	8,678568354	-1,14826682	95,73	9,500360677	-1,206884	94,93
Umbria	7,929068442	-1,189325906	96,78	8,219808518	-1,205718238	93,87
Marche	8,332989914	-1,189084024	95,28	8,335302032	-1,178310271	94,65
Lazio	9,021944001	-1,148326605	97,21	9,844528982	-1,201956852	94,86
Abruzzo	7,724805004	-1,124628896	94,16	8,29282962	-1,175330854	91,56
Molise	6,669166561	-1,181456912	95,52	6,849549458	-1,179837867	94,20
Campania	8,50268053	-1,109919888	91,52	7,829814174	-1,031422747	89,47
Puglia	9,056735208	-1,200051566	95,97	8,73957398	-1,146176856	94,26
Basilicata	7,743976642	-1,211719793	93,24	7,318060685	-1,152168218	92,09
Calabria	8,03169273	-1,147095831	95,39	7,718454505	-1,095447989	93,51
Sicilia	9,485858094	-1,217899056	95,83	8,294425363	-1,090239888	94,79
Sardegna	8,458407681	-1,194900066	96,81	8,245806054	-1,15164192	95,62

(a) Italia nord-occidentale: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria; Italia nord-orientale: Bolzano, Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna; Italia centrale: Toscana, Umbria, Marche, Lazio; Italia meridionale: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria; Italia insulare: Sicilia, Sardegna.

(b) Comuni tipo A1: Area urbana centro; Tipo A2: Area urbana periferia; Tipo B1: comuni fino a 2.000 abitanti; Tipo B2: da 2.001 a 10.000 abitanti; Tipo B3: da 10.001 a 50.000 abitanti; Tipo B4: oltre 50.000 abitanti.

Prospetto 3 – Valori interpolati degli errori campionari relativi percentuali delle stime riferite alle famiglie per totale Italia, ripartizione geografica, tipo di comune e regione – Anno 2010

STIME	Italia	Nord	Nord- ovest	Nord-est	Centro	Mezzogiorno	Sud	Isole	A1	A2	B1	B2	B3	B4
20.000	38,0	38,9	37,7	27,9	30,2	29,0	27,2	26,2	31,8	34,7	21,7	29,6	28,3	27,4
30.000	29,9	30,5	29,7	22,2	23,8	22,9	21,6	20,6	25,1	27,5	17,7	23,6	22,5	21,6
40.000	25,2	25,7	25,2	18,9	20,2	19,4	18,4	17,4	21,2	23,2	15,3	20,1	19,1	18,2
50.000	22,1	22,5	22,1	16,7	17,7	17,0	16,2	15,2	18,6	20,4	13,7	17,8	16,8	16,0
60.000	19,8	20,2	19,9	15,1	15,9	15,3	14,6	13,7	16,7	18,4	12,5	16,1	15,2	14,3
70.000	18,1	18,4	18,2	13,8	14,5	14,0	13,3	12,5	15,2	16,8	11,5	14,7	13,9	13,1
80.000	16,7	17,0	16,8	12,8	13,4	13,0	12,4	11,5	14,1	15,6	10,8	13,7	12,9	12,1
90.000	15,6	15,9	15,7	12,0	12,5	12,1	11,6	10,7	13,1	14,5	10,2	12,8	12,1	11,3
100.000	14,6	14,9	14,8	11,3	11,8	11,4	10,9	10,1	12,3	13,7	9,6	12,1	11,4	10,6
200.000	9,7	9,9	9,9	7,7	7,9	7,6	7,3	6,7	8,2	9,1	6,8	8,2	7,7	7,1
300.000	7,6	7,7	7,8	6,1	6,2	6,0	5,8	5,2	6,5	7,2	5,5	6,6	6,1	5,6
400.000	6,4	6,5	6,6	5,2	5,3	5,1	4,9	4,4	5,5	6,1	4,8	5,6	5,2	4,7
500.000	5,6	5,7	5,8	4,6	4,6	4,5	4,4	3,9	4,8	5,4	4,3	4,9	4,6	4,1
750.000	4,4	4,5	4,6	3,7	3,6	3,5	3,5	3,0	3,8	4,3	3,5	4,0	3,6	3,2
1.000.000	3,7	3,8	3,9	3,1	3,1	3,0	2,9	2,6	3,2	3,6	3,0	3,4	3,1	2,7
2.000.000	2,5	2,5	2,6	2,1	2,1	2,0	2,0	1,7	2,1	2,4	2,1	2,3	2,1	1,8
3.000.000	2,0	2,0	2,0	1,7	1,6	1,6	1,6	1,3	1,7	1,9	-	1,8	1,7	1,4
4.000.000	1,6	1,7	1,7	1,4	1,4	1,3	1,3	-	1,4	-	-	1,6	1,4	1,2
5.000.000	1,4	1,4	1,5	1,3	1,2	1,2	1,2	-	-	-	-	1,4	1,2	1,1
7.500.000	1,1	1,1	1,2	-	-	0,9	0,9	-	-	-	-	1,1	1,0	-
10.000.000	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.000.000	0,8	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.000.000	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.000.000	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

STIME	Piemonte / Valle d'Aosta - Vallée d'Aoste	Lombardia	Trentino-Alto Adige	Veneto	Friuli-Venezia Giulia	Liguria	Emilia- Romagna	Toscana	Umbria
20.000	24,5	41,0	11,8	28,9	16,9	18,7	28,1	26,0	14,6
30.000	19,7	32,4	9,3	23,0	13,2	14,7	22,3	20,6	11,5
40.000	16,9	27,4	7,8	19,5	11,1	12,4	18,9	17,5	9,7
50.000	15,0	24,1	6,9	17,2	9,7	10,9	16,6	15,4	8,5
60.000	13,6	21,7	6,2	15,5	8,7	9,7	15,0	13,8	7,6
70.000	12,5	19,8	5,6	14,2	7,9	8,9	13,7	12,7	6,9
80.000	11,7	18,3	5,2	13,2	7,3	8,2	12,7	11,7	6,4
90.000	11,0	17,1	4,9	12,3	6,8	7,7	11,9	11,0	6,0
100.000	10,4	16,1	4,6	11,6	6,4	7,2	11,2	10,3	5,6
200.000	7,2	10,8	3,0	7,8	4,2	4,8	7,5	6,9	3,7
300.000	5,8	8,5	2,4	6,2	3,3	3,8	6,0	5,5	2,9
400.000	4,9	7,2	2,0	5,3	2,8	3,2	5,1	4,7	-
500.000	4,4	6,3	-	4,7	2,4	2,8	4,4	4,1	-
750.000	3,5	5,0	-	3,7	-	-	3,5	3,2	-
1.000.000	3,0	4,2	-	3,1	-	-	3,0	2,8	-
2.000.000	2,1	2,8	-	-	-	-	-	-	-

STIME	Marche	Lazio	Abruzzo	Molise	Campania	Puglia	Basilicata	Calabria	Sicilia	Sardegna
20.000	17,9	30,9	18,2	8,1	28,8	24,3	11,9	18,9	27,6	18,5
30.000	14,0	24,5	14,5	6,4	23,0	19,1	9,3	15,0	21,6	14,5
40.000	11,8	20,7	12,3	5,4	19,6	16,0	7,8	12,7	18,1	12,2
50.000	10,4	18,2	10,8	4,7	17,3	14,0	6,8	11,2	15,8	10,7
60.000	9,3	16,4	9,8	4,2	15,7	12,6	6,1	10,1	14,1	9,6
70.000	8,5	15,0	9,0	3,9	14,4	11,5	5,6	9,2	12,9	8,8
80.000	7,8	13,9	8,3	3,6	13,3	10,6	5,1	8,5	11,9	8,1
90.000	7,3	13,0	7,8	3,3	12,5	9,9	4,8	8,0	11,0	7,5
100.000	6,9	12,3	7,3	3,1	11,8	9,3	4,5	7,5	10,4	7,1
200.000	4,5	8,2	5,0	2,1	8,0	6,1	3,0	5,1	6,8	4,7
300.000	3,6	6,5	4,0	-	6,4	4,8	2,3	4,0	5,3	3,7
400.000	3,0	5,5	3,4	-	5,5	4,0	-	3,4	4,5	3,1
500.000	2,6	4,9	3,0	-	4,8	3,5	-	3,0	3,9	2,7
750.000	2,1	3,9	2,4	-	3,9	2,8	-	2,4	3,0	2,1
1.000.000	-	3,3	-	-	3,3	2,3	-	-	2,5	-
2.000.000	-	2,2	-	-	2,2	-	-	-	1,7	-

Prospetto 4 – Valori interpolati degli errori campionari relativi percentuali delle stime riferite alle persone per totale Italia, ripartizione geografica, tipo di comune e regione – Anno 2010

STIME	Italia	Nord	Nord-ovest	Nord-est	Centro	Mezzogiorno	Sud	Isole	A1	A2	B1	B2	B3	B4
20.000	32,4	34,5	36,9	29,5	29,1	29,5	29,0	27,6	35,2	32,5	21,4	29,9	29,7	30,3
30.000	26,0	27,7	29,5	23,6	23,4	23,6	23,3	22,1	27,5	26,5	17,4	24,2	23,8	23,7
40.000	22,3	23,7	25,2	20,1	20,0	20,1	19,9	18,9	23,1	22,9	15,1	20,8	20,4	19,9
50.000	19,8	21,0	22,3	17,8	17,7	17,8	17,6	16,7	20,1	20,4	13,4	18,5	18,0	17,4
60.000	18,0	19,0	20,2	16,1	16,1	16,1	16,0	15,1	18,0	18,6	12,3	16,8	16,3	15,6
70.000	16,5	17,5	18,5	14,7	14,8	14,8	14,7	13,9	16,4	17,2	11,3	15,5	15,0	14,2
80.000	15,4	16,2	17,2	13,7	13,8	13,7	13,7	12,9	15,1	16,1	10,6	14,5	14,0	13,1
90.000	14,4	15,2	16,1	12,8	12,9	12,8	12,8	12,1	14,1	15,1	10,0	13,6	13,1	12,2
100.000	13,7	14,4	15,2	12,1	12,2	12,1	12,1	11,4	13,2	14,3	9,4	12,9	12,4	11,5
200.000	9,4	9,9	10,4	8,2	8,4	8,3	8,3	7,8	8,7	10,1	6,6	9,0	8,5	7,5
300.000	7,6	7,9	8,3	6,6	6,7	6,6	6,7	6,3	6,8	8,2	5,4	7,2	6,8	5,9
400.000	6,5	6,8	7,1	5,6	5,8	5,6	5,7	5,3	5,7	7,1	4,7	6,2	5,8	5,0
500.000	5,8	6,0	6,3	5,0	5,1	5,0	5,0	4,7	5,0	6,3	4,2	5,5	5,1	4,3
750.000	4,6	4,8	5,0	4,0	4,1	4,0	4,0	3,8	3,9	5,1	3,4	4,5	4,1	3,4
1.000.000	4,0	4,1	4,3	3,4	3,5	3,4	3,5	3,2	3,3	4,4	2,9	3,9	3,5	2,9
2.000.000	2,7	2,8	2,9	2,3	2,4	2,3	2,4	2,2	2,1	3,1	2,1	2,7	2,4	1,9
3.000.000	2,2	2,3	2,3	1,8	1,9	1,8	1,9	1,8	1,7	2,5	1,7	2,2	1,9	1,5
4.000.000	1,9	1,9	2,0	1,6	1,7	1,6	1,6	1,5	1,4	2,2	1,4	1,9	1,7	1,2
5.000.000	1,7	1,7	1,8	1,4	1,5	1,4	1,4	1,3	1,2	2,0	-	1,7	1,5	1,1
7.500.000	1,3	1,4	1,4	1,1	1,2	1,1	1,2	1,1	1,0	1,6	-	1,3	1,2	0,8
10.000.000	1,2	1,2	1,2	0,9	1,0	0,9	1,0	-	0,8	-	-	1,2	1,0	0,7
15.000.000	0,9	0,9	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8	-	-	-	-	0,9	0,8	0,6
20.000.000	0,8	0,8	0,8	-	0,7	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-
25.000.000	0,7	0,7	-	-	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-

STIME	Piemonte / Valle d'Aosta - Vallée d'Aoste	Lombardia	Trentino-Alto Adige	Veneto	Friuli-Venezia Giulia	Liguria	Emilia- Romagna	Toscana	Umbria
20.000	24,9	39,3	10,4	30,6	17,4	19,6	30,0	29,3	15,6
30.000	20,1	31,6	8,0	24,4	13,8	15,5	23,9	23,0	12,2
40.000	17,2	27,0	6,7	20,8	11,7	13,1	20,4	19,3	10,2
50.000	15,3	24,0	5,8	18,4	10,3	11,5	18,0	16,9	9,0
60.000	13,9	21,7	5,1	16,6	9,3	10,3	16,2	15,1	8,0
70.000	12,8	20,0	4,6	15,2	8,5	9,4	14,9	13,8	7,3
80.000	11,9	18,6	4,3	14,1	7,9	8,7	13,8	12,7	6,7
90.000	11,2	17,5	3,9	13,2	7,4	8,2	12,9	11,8	6,3
100.000	10,6	16,5	3,7	12,5	6,9	7,7	12,2	11,1	5,9
200.000	7,3	11,3	2,4	8,5	4,7	5,1	8,3	7,3	3,9
300.000	5,9	9,1	1,8	6,8	3,7	4,0	6,6	5,7	3,0
400.000	5,1	7,8	1,5	5,8	3,1	3,4	5,6	4,8	2,6
500.000	4,5	6,9	-	5,1	2,8	3,0	5,0	4,2	2,2
750.000	3,6	5,6	-	4,1	2,2	2,4	4,0	3,3	1,8
1.000.000	3,1	4,8	-	3,5	1,9	2,0	3,4	2,8	-
2.000.000	2,2	3,3	-	2,3	-	-	2,3	1,8	-
3.000.000	1,7	2,6	-	1,9	-	-	1,8	1,4	-
4.000.000	1,5	2,3	-	1,6	-	-	-	-	-
5.000.000	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-

Prospetto 4 segue – Valori interpolati degli errori campionari relativi percentuali delle stime riferite alle persone per totale Italia, ripartizione geografica, tipo di comune e regione – Anno 2010

STIME	Marche	Lazio	Abruzzo	Molise	Campania	Puglia	Basilicata	Calabria	Sicilia	Sardegna
20.000	18,9	35,7	18,8	8,9	30,3	27,1	12,9	20,9	28,6	20,6
30.000	14,9	28,0	14,8	7,0	24,6	21,5	10,2	16,7	22,9	16,3
40.000	12,6	23,5	12,5	5,9	21,2	18,2	8,7	14,3	19,6	13,8
50.000	11,0	20,6	10,9	5,2	18,9	16,0	7,6	12,7	17,4	12,2
60.000	9,9	18,5	9,8	4,7	17,2	14,4	6,9	11,5	15,7	10,9
70.000	9,0	16,8	9,0	4,3	15,9	13,2	6,3	10,5	14,5	10,0
80.000	8,3	15,5	8,3	3,9	14,8	12,2	5,8	9,8	13,4	9,3
90.000	7,8	14,5	7,8	3,7	14,0	11,4	5,4	9,2	12,6	8,7
100.000	7,3	13,6	7,3	3,4	13,2	10,8	5,1	8,7	11,9	8,2
200.000	4,9	9,0	4,8	2,3	9,3	7,2	3,4	5,9	8,2	5,5
300.000	3,8	7,0	3,8	1,8	7,5	5,7	2,7	4,7	6,5	4,3
400.000	3,2	5,9	3,2	-	6,5	4,9	2,3	4,1	5,6	3,7
500.000	2,8	5,2	2,8	-	5,8	4,3	2,0	3,6	4,9	3,2
750.000	2,2	4,0	2,2	-	4,7	3,4	1,6	2,9	4,0	2,6
1.000.000	1,9	3,4	1,9	-	4,0	2,9	-	2,5	3,4	2,2
2.000.000	1,3	2,2	1,3	-	2,8	1,9	-	1,7	2,3	1,5
3.000.000	-	1,8	-	-	2,3	1,5	-	-	1,9	-
4.000.000	-	1,5	-	-	2,0	1,3	-	-	1,6	-
5.000.000	-	1,3	-	-	1,8	1,1	-	-	1,4	-

3.4 Esempi di calcolo degli errori campionari

3.4.1 Esempi relativi alle stime delle persone

Esempio 1

Nel 2010, in Campania le persone di 14 anni e più che hanno partecipato a Riunioni in associazioni culturali sono 280.000.

Si cerca il livello di stima che più si avvicina a 280.000 nella prima colonna del prospetto 4 per il totale Italia.

L'errore relativo percentuale della stima considerata è pari a 7,5 %.

L'errore assoluto sarà:

$$\sigma(280.000) = 0,017 \times 280.000 = 21.000$$

L'intervallo di confidenza avrà come estremi :

$$280.000 - (1,96 \times 21.000) = 238.840$$

$$280.000 + (1,96 \times 21.000) = 321.160$$

Esempio 2

Considerando la stima precedente si possono ottenere valori più precisi dell'errore di campionamento operando mediante interpolazione lineare dei due livelli di stima consecutivi tra i quali è compreso il valore della stessa.

Tali livelli sono 200.000 e 300.000 ai quali corrispondono i valori percentuali 9,3 e 7,5.

L'errore relativo corrispondente a 280.000 è pari a :

$$\sigma(280.000) = 13,2 - \{ [(9,3 - 7,5) / (300.000 - 200.000)] \times (280.000 - 200.000) \} = 8,94\%$$

Il corrispondente errore assoluto è $0,0894 \times 280.000 = 25.032$
e l'intervallo di confidenza avrà come estremi:

$$280.000 - (1,96 \times 25.032) = 230.937$$

$$280.000 + (1,96 \times 25.032) = 329.063$$

Esempio 3

Il calcolo dell'errore può essere effettuato, direttamente, tramite la funzione interpolante:

$$\hat{\varepsilon}(\hat{Y}) = \sqrt{\exp(a + b \log(\hat{Y}))}$$

i cui parametri, riportati nel prospetto 2 alla riga Italia, sono i seguenti:

$$a = 7,829814$$

$$b = -1,031423.$$

Per $\hat{Y} = 208.000$ si ha:

$$\hat{\varepsilon}(\hat{Y}) = \sqrt{\exp(7,829814 - 1,031423 \times \log(280.000))} = 0,0778.$$

L'errore relativo percentuale è quindi pari al 7,78% e il calcolo dell'errore assoluto e dell'intervallo di confidenza è del tutto analogo a quello degli esempi 1 e 2.