

Mortalità infantile: comprende i morti nel primo anno di vita, ovvero i nati vivi deceduti anteriormente al compimento del primo compleanno, inclusi quelli morti prima della registrazione della nascita

MORTALITÀ INFANTILE PER 1.000 NATI VIVI




SPESA EFFETTIVA FAMILIARE PER BENI E SERVIZI SANITARI NEL 2013

Ricoveri ospedalieri	211
Visite mediche	124
Dentista	319
Infermieri, fisioterapisti, ginnastica correttiva, ecc.	164
Analisi cliniche	67
Esami radiologici, ecografici, elettrocardiogramma, ecc.	87
Occhiali da vista, lenti a contatto, apparecchi per la pressione, ecc.	178
Medicinali	85
Termometri/siringhe	37
euro	

6 SALUTE E SANITÀ

MORTALITÀ PER ALCUNE CAUSE

Anni 1931, 1971 e 2011 per 100.000 abitanti




ALCUNI INDICATORI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Anno 2011

	Nord	Centro	Mezzogiorno	Italia
Medici di medicina generale	19.608	9.771	16.682	46.061
Tasso medici generici*	7,2	8,4	8,1	7,8
Assistiti per medico	1.231	1.074	1.080	1.143
Pediatrati di base	3.258	1.517	2.941	7.716
Tasso pediatri di base**	8,6	9,6	9,6	9,2
Assistiti per pediatra (<14 anni)	922	846	825	870
Servizi di guardia medica	795	416	1.670	2.881
Medici di guardia medica	3.073	1.839	7.009	11.921
Aziende sanitarie locali (Asl)	74	29	42	145
Centri unificati di prenotazione (Cup)	65	29	41	135


* per 10.000 abitanti ** per 10.000 bambini di 0-14 anni



SPESA SANITARIA CORRENTE PER SETTORE

Anni 2010-2013, valori a prezzi correnti (miliardi di euro)

FUMATORI PER NUMERO DI SIGARETTE FUMATE AL GIORNO NEL 2013




composizione percentuale

Interruzione volontaria di gravidanza (IVG): dopo l'introduzione della legge 194/78, che ha regolamentato l'interruzione volontaria di gravidanza in Italia, si è verificata una netta riduzione del fenomeno. Il picco è stato registrato negli anni 1982 e 1983, con un numero di interventi superiore a 230 mila ogni anno e un tasso di abortività pari rispettivamente a 16,7 e a 16,4 per 1.000 donne residenti di età 15-49 anni. Da quel momento il tasso di abortività si è progressivamente ridotto, fino ad arrivare a livelli inferiori all'8 per 1.000

Indice di massa corporea (IMC): si ottiene dal rapporto tra il peso corporeo, espresso in chilogrammi, e il quadrato della statura, espressa in metri. Un individuo è sottopeso per valori IMC inferiori a 18,5; normopeso da 18,5 a 24,99; sovrappeso da 25 a 29,99; obeso per valori uguali o maggiori di 30

INTERRUZIONI VOLONTARIE DI GRAVIDANZA

Anni 1980-2011, per 1.000 donne residenti di 15-49 anni



CONSUMATORI DI FARMACI* PER CLASSE DI ETÀ

Anni 1993-2013, migliaia di persone

	1993	1998	2007	2009	2011	2013
Fino a 14 anni	1.524	1.396	1.557	1.372	1.234	1.113
15-34 anni	2.753	2.626	2.834	2.926	2.620	2.402
35-64 anni	7.317	7.686	9.694	9.997	9.871	10.240
65 anni e più	5.986	6.933	9.008	9.509	9.607	10.318
Totale	17.580	18.641	23.093	23.804	23.332	24.073

* nei due giorni precedenti l'intervista

PERSONE PER INDICE DI MASSA CORPOREA

Anno 2013, per 100 persone di 18 anni e più

