

L'andamento dei decessi del 2020.

Dati anticipatori sulla base del sistema ANPR

L'Istat, grazie alle sinergie attivate con il Ministero dell'Interno per l'acquisizione tempestiva dei dati ANPR è in grado di contribuire alla diffusione di informazioni utili alla comprensione della situazione legata all'emergenza sanitaria da COVID-19.

L'utilizzo a fini statistici, e il relativo trattamento, delle informazioni che l'Istituto nazionale di statistica acquisisce dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), come previsto dal DPCM n.194/2014, permette di diffondere i dati relativi alla mortalità generale di una parte dei comuni subentrati nell'ANPR, che a oggi ammontano a 5.866, circa tre quarti del totale dei comuni italiani.

I dati di mortalità registrati dai singoli comuni vengono acquisiti nell'ambito del sistema informativo gestito dal Ministero dell'Interno e trasmessi, sulla base degli Accordi di Servizio che hanno sostanzialmente la collaborazione definita dal citato DPCM, con flusso continuo all'Istat. L'utilizzo a fini statistici di tali dati prevede un trattamento e una loro validazione, analogamente a quanto è avvenuto in passato quando i dati venivano acquisiti direttamente dai Comuni (e come avviene ancora oggi per i comuni non subentrati in ANPR). Tale attività di validazione statistica richiede mediamente un periodo di 4 mesi, ma in virtù della situazione emergenziale, l'Istat provvede, a partire da oggi, alla loro diffusione con tempistica molto serrata, prevedendo inoltre un aggiornamento dei dati nel corso dei prossimi giorni e delle prossime settimane.

Gli ulteriori aggiornamenti sono previsti sia per seguire il fenomeno con frequenza ristretta, sia per integrare e correggere dati che risultano ancora incompleti. Infatti, a fronte dell'enorme valore conoscitivo e strategico dell'ANPR, occorre considerare il fatto che alcuni Comuni non sono ancora subentrati e che altri, già subentrati, trasmettono le notifiche di variazione anagrafica al sistema informativo centrale con notevole ritardo.

Esistono infatti delle situazioni in cui l'aggiornamento è generalmente meno tempestivo, in questi casi si è scelto di non diffondere dati verosimilmente non ancora completi. Ciò che viene diffuso oggi dall'Istat si riferisce ai decessi per qualunque causa e non solo per Coronavirus) dal primo gennaio al 21 marzo 2020 per una parte (1.084 su 5.866) dei comuni subentrati in ANPR entro il 31 dicembre 2019¹. Questi decessi vengono affiancati all'andamento medio osservato per lo stesso periodo negli anni 2015-2019.

¹ Al momento sono stati verificati i comuni con un numero di decessi che, nel periodo 1° gennaio 21 marzo 2020, è risultato superiore o uguale a 10 unità e che nel mese di marzo del 2020 hanno presentato, rispetto alla corrispondente media del quinquennio 2015-2019, un incremento della mortalità pari ad almeno il 20%. Il dataset sarà

I dati sui decessi 2020 saranno aggiornati periodicamente in modo da garantire un monitoraggio tempestivo della evoluzione della mortalità totale sulla base di evidenze sempre più consolidate.

Le informazioni che vengono messe a disposizione sono le seguenti:

- Un dataset analitico che riporta i decessi giornalieri in ogni singolo comune per sesso e classi di età quinquennali (per i primi 4 mesi degli anni che vanno dal 2015 al 2019 e, solo per i comuni verificati, l'aggiornamento per il periodo che va dal 1° gennaio al 21 marzo² 2020).
- Un dataset sintetico con i decessi per settimana per comune, provincia e regione, distinti per sesso e classi di età aggregate (solo i comuni verificati per il periodo 1° gennaio-21 marzo degli anni che vanno dal 2015 al 2020). Le settimane sono state definite come intervalli di sette giorni consecutivi prendendo come riferimento i primi sette giorni del mese di marzo 2020.

Prima sintesi delle principali evidenze

Il 21 febbraio 2020, l'ISS ha confermato il primo caso autoctono diagnosticato all'Ospedale Sacco di Milano di COVID-19 (Corona Virus Disease). L'epidemia italiana è iniziata nel Nord Italia, in Lombardia, che ad oggi registra circa il 40% dei casi notificati a livello nazionale e oltre il 60% dei decessi, seguita dall'Emilia-Romagna (13% dei casi e 14% dei decessi), mentre nelle regioni del Centro-Sud di registrano circa il 19% dei casi nazionali e l'11% dei decessi (dati aggiornati al 26 marzo 2020, fonte Dipartimento Protezione Civile)³.

Con il diffondersi dell'epidemia è stato rilevato a livello locale un aumento del numero di morti spesso superiore a quello ufficialmente attribuito a COVID-19. Il monitoraggio dell'andamento dei decessi nel loro complesso, indipendentemente dalla causa, è dunque di assoluto rilievo.

In questa prima diffusione dei dati tempestivi di mortalità di fonte ANPR l'Istat ha scelto di concentrare l'attenzione sui comuni con almeno dieci decessi da gennaio al 21 marzo 2020 che hanno fatto registrare un aumento dei morti superiore al 20 per cento nei primi 21 giorni di marzo 2020, rispetto al dato medio dello stesso periodo degli anni 2015-2019.


I comuni presi in considerazione sono 1.084. La figura 1 mette in evidenza la distribuzione per classi di incremento dei decessi; nei comuni del Nord si registrano le variazioni più consistenti: in oltre la metà, i decessi per il complesso delle cause sono più che raddoppiati nel mese di Marzo in soli 21 giorni.

ulteriormente arricchito a seguito della progressiva validazione dei dati relativi anche ad altri comuni e ne sarà data tempestiva comunicazione.

² La limitazione al 21 marzo deriva dal fatto che le prime analisi dei dati mostrano chiaramente come i flussi di aggiornamento relativi all'ultima settimana risentano di ritardi dovuti alla trasmissione e/o all'acquisizione degli eventi in ANPR e non sono quindi diffondibili. Inoltre, per alcuni Comuni, va precisato che tali ritardi possono riguardare anche più settimane.

³ Andamento della Mortalità Giornaliera (SiSMG) nelle città italiane in relazione all'epidemia di Covid-19, epidemiologia e prevenzione, http://www.epiprev.it/sites/default/files/SISMG_COVID19_28032020-2.pdf

Figura 1. Comuni verificati^a per ampiezza della variazione percentuale della mortalità totale dal primo al 21 marzo 2020 rispetto alla media dello stesso periodo degli anni 2015-2019, per ripartizione geografica (per cento comuni verificati della stessa ripartizione)



Note: (a) i comuni subentrati nell'ANPR che hanno almeno 10 decessi nel periodo primo gennaio-21 marzo 2020 e un aumento della mortalità totale di almeno il 20% nel periodo primo marzo-21 marzo 2020 rispetto al corrispondente valore medio nel quinquennio 2015-2019

L'incremento della mortalità complessiva osservato nel mese di marzo rappresenta una brusca inversione di tendenza dell'andamento della mortalità giornaliera dei mesi di gennaio e febbraio 2020. Nei primi due mesi del nuovo anno, infatti, i decessi erano stati inferiori al numero medio osservato nello stesso periodo nel 2015-2019. Un fenomeno che può ritenersi attribuibile al ridotto impatto nei primi due mesi dell'anno dei fattori di rischio stagionali (condizioni climatiche ed epidemie influenzali). Ciò spiega come mai, se si considera il complesso dei decessi dal primo gennaio al 21 marzo 2020, in diversi comuni non si ravvisa un aumento, ma piuttosto una diminuzione del numero dei morti, rispetto al dato medio dello stesso periodo degli anni 2015-2019.

L'incremento dei decessi per il complesso delle cause è, dunque, ravvisabile solo a partire dalla fine di febbraio e dalla prima settimana di marzo ed è concentrato nei comuni del nord e del centro in cui l'epidemia si è diffusa di più. In queste aree si osservano aumenti ragguardevoli non solo nei centri urbani maggiori, ma anche in realtà comunali di dimensioni demografiche più contenute.

Si evidenzia, come noto, la situazione particolarmente critica dei comuni della provincia di Bergamo. Il capoluogo vede quasi quadruplicare i decessi per il complesso delle cause delle prime tre settimane di marzo, passando da una media di 91 casi nel 2015-2019 a 398 nel 2020. Incrementi della stessa intensità, quando non superiori, interessano la maggior parte dei comuni della provincia bergamasca. Situazioni particolarmente allarmanti si riscontrano anche nella provincia di Brescia, nel cui capoluogo i decessi nelle prime tre settimane di marzo sono più che raddoppiati: da 134 nel 2015-2019 a 381 nel 2020. Va ancora rilevato come incrementi superiori al 200% siano presenti anche in capoluoghi come Piacenza o Pesaro.

Considerando il genere e la classe di età dei deceduti si conferma il maggiore incremento dei decessi degli uomini e delle persone maggiori di 74 anni di età (Figura 2). Le differenze tra i due generi sono particolarmente accentuate nei più anziani residenti al Nord, per gli


uomini infatti si osserva un incremento dei decessi del 168% a fronte del 98% per le donne, nella classe di età 75 e più.

Con il consolidarsi della base dati Istat sui decessi di fonte ANPR sarà possibile estendere queste prime analisi via via ad un numero sempre maggiore di comuni e rendere disponibile alla comunità scientifica, ai decisori e ai cittadini dati di dettaglio utili per la comprensione delle dinamiche in atto.


Saranno inoltre effettuati ulteriori approfondimenti anche in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità per un più efficace monitoraggio dell'impatto dell'epidemia COVID-19 sulla mortalità complessiva.

Figura 2. Variazione percentuale della mortalità totale dal primo al 21 marzo 2020 rispetto alla media dello stesso periodo degli anni 2015-2019, per genere, classe di età e ripartizione geografica.

NORD



CENTRO



MEZZOGIORNO

